

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION

74ª REUNIÓN

BUSAN (COREA)
26-30 DE JUNIO DE 2006

DOCUMENTO IATTC-74-04

**LOS ATUNES Y PECES PICUDOS EN EL OCÉANO PACÍFICO
ORIENTAL EN 2005**

A.	La pesquería de atunes y peces picudos en el Océano Pacífico oriental	1
B.	Atún aleta amarilla	50
C.	Atún barrilete	59
D.	Atún patudo.....	63
E.	Atún aleta azul del Pacífico	73
F.	Atún albacora	75
G.	Pez espada.....	78
H.	Marlín azul	80
I.	Marlín rayado.....	82
J.	Consideraciones de ecosistema.....	84

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene un resumen de la pesquería de atunes en el Océano Pacífico oriental (OPO), una evaluación de las poblaciones de atunes y peces picudos que son explotadas en la pesquería, y una evaluación del ecosistema pelágico en el OPO.

El informe basa en datos disponibles al personal de la CIAT en marzo de 2006. Las tres secciones sobre peces picudos (G, H, I), son esencialmente iguales a las secciones correspondientes del Informe de la Situación de la Pesquería 3, publicado en 2005, salvo actualizaciones de las figuras.

Se expresa el peso de capturas y descartes en toneladas métricas (t). En las tablas, 0 en una casilla significa ningún esfuerzo o una captura de menos de 1 tonelada métrica, una casilla en blanco significa que no se tomaron datos, y * significa datos faltantes o no disponibles. Se usan las abreviaturas siguientes:

Especies:

ALB	Atún albacora (<i>Thunnus alalunga</i>)
BET	Atún patudo (<i>Thunnus obesus</i>)
BIL	Peces picudos Istiofóridos no identificados
BKJ	Atún barrilete negro (<i>Euthynnus lineatus</i>)
BLM	Marlín negro (<i>Makaira indica</i>)
BUM	Marlín azul (<i>Makaira nigricans</i>)
BZX	Bonito (<i>Sarda</i> spp.)
CAR	Chondrichthyes, peces cartilaginosos nep ¹
CGX	Carángidos (Carangidae)
DOX	Dorados (<i>Coryphaena</i> spp.)
MLS	Marlín rayado (<i>Tetrapturus audax</i>)
MZZ	Osteichthyes, peces marinos nep
PBF	Atún aleta azul del Pacífico (<i>Thunnus orientalis</i>)

SFA	Pez vela del Indo-Pacífico (<i>Istiophorus platypterus</i>)
SKJ	Atún barrilete (<i>Katsuwonus pelamis</i>)
SKX	Elasmobranquios no identificados
SSP	Marlín trompa corta (<i>Tetrapturus angustirostris</i>)
SWO	Pez espada (<i>Xiphias gladius</i>)
TUN	Atunes no identificados
YFT	Atún aleta amarilla (<i>Thunnus albacares</i>)

Tipos de lance:

DEL	Delfín
NOA	Peces no asociados
OBJ	Objeto flotante
	FLT: Natural
	FAD: Plantado

¹ no especificado en otra partida

Banderas:

BLZ	Belice
BOL	Bolivia
CAN	Canadá
CHN	China
COL	Colombia
CRI	Costa Rica
ECU	Ecuador
ESP	España
GTM	Guatemala
HND	Honduras
JPN	Japón
KOR	República de Corea
MEX	México
NIC	Nicaragua
PAN	Panamá
PER	Perú
PYF	Polinesia Francesa
SLV	El Salvador
TWN	Taipei Chino
UNK	Desconocido
USA	Estados Unidos de América
VEN	Venezuela
VUT	Vanuatu

Artes de pesca:

FPN	Almadraba
GN	Red de transmalle
HAR	Arpón
LL	Palangre
LP	Caña
LTL	Curricán
OTR	Otras ²
NK	Desconocido
PS	Red de cerco
RG	Deportivo
TX	Red de arrastre

Áreas oceánicas:

EPO	Océano Pacífico oriental
WCPO	Océano Pacífico occidental y central

Evaluación de poblaciones:

B	Biomasa
C	Captura
CPUE	Captura por unidad de esfuerzo
<i>F</i>	Coficiente de mortalidad por pesca
RMSP	Rendimiento máximo sostenible promedio
SBR	Cociente de la biomasa reproductora
SSB	Biomasa de la población reproductora

² Usado para agrupar artes conocidas

A. LA PESQUERÍA DE ATUNES Y PECES PICUDOS EN EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL

1.	Capturas y descargas de atunes, peces picudos, y especies asociadas	1
1.1.	Capturas por especie	2
1.2.	Distribución de las capturas de atunes	5
1.3.	Composición por tamaño de las capturas de atunes.....	5
1.4.	Capturas de escómbridos, por bandera y arte	7
1.5.	Descargas de buques de cerco y caña	8
1.6.	Capturas cerqueras por metro cúbico de volumen de bodega.....	8
2.	Esfuerzo.....	8
2.1.	Pesca de cerco	8
2.2.	Pesca palangrera	9
3.	La flota	9
3.1.	La flota de cerco y cañera	9
3.2.	Otras flotas del OPO	10

En esta sección se presenta un resumen de las pesquerías de las especies amparadas por la Convención de la CIAT (atunes y otras especies capturadas por buques atuneros) en el Océano Pacífico oriental (OPO). Las más importantes de éstas son los escómbridos (familia Scombridae), que incluyen los atunes, bonitos, carites y caballas. Las especies principales de atunes capturadas son el aleta amarilla, barrilete, patudo y albacora, con capturas menores de los atunes aleta azul del Pacífico y barrilete negro y de melvas; se capturan también otros escómbridos, como el bonito y el peto.

El informe abarca también otras especies capturadas por buques atuneros en el OPO: peces picudos (pez espada, marlines y pez vela), carángidos (jureles y salmón), dorado, elasmobranchios (tiburones y rayas) y otros peces.

La mayor parte de las capturas es realizada por las flotas de cerco y palangrera; la flota cañera y varias pesquerías artesanales y deportivas toman un pequeño porcentaje de las capturas totales.

Se dispone de datos detallados de las pesquerías cerquera y cañera; los datos de las pesquerías palangreras, artesanales y deportivas son menos completas.

El Registro Regional de Buques de la CIAT contiene detalles de los buques autorizados para pescar atunes en el OPO. La CIAT cuenta con registros detallados de la mayoría de los buques cerqueros y cañeros que pescan atunes aleta amarilla, barrilete, patudo y/o aleta azul del Pacífico en el OPO. El Registro es incompleto para buques pequeños. Incluye los buques palangreros grandes (>24 m) de algunas naciones que pescan en el OPO y en otros océanos.

Se agrupa a los buques cerqueros en seis clases de tamaño, por su capacidad de acarreo en metros cúbicos (m³) de volumen de bodega:

Clase	1	2	3	4	5	6
Volumen (m ³)	<53	53-106	107-212	213-319	320-425	>425

Los datos en el presente informe provienen de varias fuentes, entre ellas los cuadernos de bitácora de los buques, datos de observadores, registros de descargas provistos por empresas enlatadoras y otros procesadores, registros de importaciones y exportaciones, estimaciones derivadas del programa de muestreo de especies y composición por talla, informes de los gobiernos y otras entidades, e informes publicados.

1. CAPTURAS Y DESCARGAS DE ATUNES, PECES PICUDOS, Y ESPECIES ASOCIADAS

Estimar la captura total de una especie de pez es difícil, por varios motivos. Pescado es descartado en el mar, y los datos de algunas artes de pesca son a menudo incompletos. Desde 1993 los observadores han tomado datos sobre pescado descartado en el mar por buques cerqueros de la Clase 6. Esta información

permite una estimación más precisa de las cantidades totales de pescado capturadas por la flota de cerco. Las estimaciones de la cantidad total de la captura que se descarga (en lo sucesivo la “captura retenida”) se basan principalmente en datos de descarga. A partir del informe de 2004, los datos de descargas de buques cerqueros y cañeros son ajustados con base en las estimaciones de composición por especies para los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo. El programa actual de muestreo de composición por especies, descrito en la Sección 1.6.1, comenzó en 2000, y por lo tanto los datos de captura de 2000-2005 son ajustados con base en las estimaciones obtenidas para cada año, por bandera. Para ajustar los datos de captura de los años previos, se aplicó la proporción media de especies de las estimaciones de 2000-2005, por bandera, y se sumó para todas las banderas. En general, esto ha incrementado las capturas estimadas de patudo, y reducido aquéllas de aleta amarilla y barrilete. Todos estos ajustes son preliminares, y podrán ser mejorados en el futuro. Todos los datos de 2005 de capturas y descargas de la flota cerquera y cañera son provisionales.

Se obtienen los datos de las capturas retenidas de la mayoría de los buques palangreros grandes de los gobiernos de las naciones que pescan atunes en el OPO. Los buques palangreros, particularmente los más grandes, dirigen su esfuerzo principalmente hacia los atunes patudo, aleta amarilla, y albacora, o el pez espada. Los datos de los buques palangreros pequeños, artesanales y otros que pescan atunes, peces picudos, dorado, y tiburones en el OPO fueron obtenidos directamente de los gobiernos, de los cuadernos de bitácora, o de informes publicados por los gobiernos. Los datos del Pacífico occidental y central (WCPO) fueron provistos por el Programa de Pesquerías Oceánicas de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC). Todos los datos de palangre y otras artes de 2004 y 2005 son preliminares.

Los datos de todas estas fuentes fueron compilados en una base de datos por el personal de la CIAT y resumidos en el presente informe. En los últimos años, el personal de la CIAT ha incrementado sus esfuerzos por compilar datos sobre las capturas de atunes, peces picudos, y otras especies capturadas con otras artes, como curricán, arpón, y red de transmalle, y artes deportivas. En la Tabla A-1 se presentan las capturas totales de aleta amarilla, barrilete, y patudo en el Océano Pacífico entero, estimadas de todas las fuentes mencionadas; son tratadas en mayor detalle en las secciones siguientes.

En la Tabla A-2 se presentan estimaciones de las capturas anuales retenidas y descartadas de atunes y otras especies capturadas por buques atuneros en el OPO durante 1976-2005. En las Tablas A-3a-e se presentan las capturas de atunes y bonitos por todas las artes durante 2001-2005, por arte y bandera, y en las Tablas A-4a-b se resumen por bandera las capturas y descargas cerqueras, cañeras y deportivas de atunes y bonitos durante 2003-2004. No se restringió la pesca del atún en el OPO durante 1988-1997, pero las capturas de la mayoría de las especies fueron afectadas por las restricciones de la pesca durante partes, o la totalidad, del segundo semestre del año durante 1998-2005. Además, la reglamentación de aquellos cerqueros que dirigen su esfuerzo hacia atunes asociados con delfines afectó el modo de operación de esos buques, especialmente desde fines de los años 1980 (ver Sección 3).

Las capturas fueron afectadas también por perturbaciones climáticas, tales como los importantes eventos de El Niño que ocurrieron durante 1982-1983 y 1997-1998. Estos redujeron la vulnerabilidad de los peces a la captura con red de cerco debido a la mayor profundidad de la termoclina, pero aparentemente no tuvieron ningún efecto sobre las capturas palangreras. El reclutamiento de aleta amarilla suele ser mayor después de un evento de El Niño. En la Sección J.5, *Ambiente físico*, se comentan en mayor detalle los efectos de los eventos de El Niño y otras condiciones ambientales sobre la pesca en el OPO.

1.1. Capturas por especie

1.1.1. Atún aleta amarilla

En la Tabla A-1 y la Figura B-1 se presentan las capturas anuales de aleta amarilla durante 1976-2005. En general, las capturas han aumentado durante este período en el OPO y en el Pacífico occidental y central. En el OPO, el Niño de 1982-1983 causó una reducción de las capturas en esos años, pero las capturas en el resto del Pacífico aparentemente no fueron afectadas. Aunque el alcance del Niño de 1997-1998 fue mayor, no tuvo el mismo efecto sobre las capturas de aleta amarilla en el OPO. En el Pacífico occi-

dental y central alcanzaron 354 mil toneladas (t) en 1990 y un pico de 463 mil t en 1998, y siguieron altas hasta 2004 (no se dispone todavía de datos de 2005 para esa región). Las capturas fueron altas en el Pacífico entero durante 2001-2003. En el OPO, la captura de aleta amarilla en 2002, 443 mil t, estableció un récord, pero en 2004 y 2005 disminuyó sustancialmente.

En la Tabla A-2a se presentan las capturas retenidas anuales de aleta amarilla en el OPO por buques cerqueros y cañeros durante 1976-2005. La captura retenida anual media durante 1990-2004 fue 275 mil t (rango: 212 a 413 mil t); la estimación preliminar de la captura retenida en 2005, 272 mil t, fue 1% menor que en 2004, y un 2% inferior al promedio de 1990-2004. Los descartes medios de aleta amarilla en el mar durante 1993-2005 se cifraron en un 2% (rango: 1 a 3%) de la captura total cerquera (capturas retenidas más descartes) de la especie (Tabla A-2a).

En la Tabla A-2a se presentan las capturas retenidas anuales de aleta amarilla en el OPO por buques palangreros durante 1976-2005. Durante 1990-2004 fueron relativamente estables, con un promedio de unas 22 mil t (rango: 10 a 35 mil t), o un 7% de las capturas retenidas totales de la especie. El aleta amarilla es capturado también por buques de pesca deportiva, incidentalmente en redes de trasmalle, y en pesquerías artesanales. En la columna de Otras artes (OTR) de la Tabla A-2a se presentan estimaciones de estas capturas; durante 1990-2004 fueron en promedio unas 2 mil t.

En la Sección B del presente informe se presenta mayor información sobre el atún aleta amarilla.

1.1.2. Atún barrilete

En la Tabla A-1 y la Figura C-1 se presentan las capturas anuales de barrilete durante 1976-2005. La mayoría de la captura de barrilete en el Pacífico proviene del Pacífico occidental y central. La mayor captura anual registrada en esa región, 1,3 millones de toneladas, ocurrió en 1998, mientras que la captura récord en el OPO, 299 mil t, ocurrió en 2003.

En la Tabla A-2a se presentan las capturas retenidas anuales de barrilete en el OPO por buques cerqueros y cañeros durante 1976-2005. La captura retenida anual media durante 1990-2004 fue 144 mil t (rango: 64 a 276 mil t). La estimación preliminar de la captura retenida de barrilete en 2005 es de 263 mil t, un 82% más que el promedio de 1990-2004, pero un 14% menos que la captura récord de 2003. Los descartes medios anuales de barrilete en el mar durante 1993-2005 se cifraron en un 11% (rango: 7 a 19%) de la captura total de la especie (Tabla A-2a).

Se capturan pequeñas cantidades de barrilete con palangre y otros tipos de arte (Tabla A-2a).

En la Sección C del presente informe se presenta mayor información sobre el atún barrilete.

1.1.3. Atún patudo

En la Tabla A-1 y la Figura D-1 se presentan las capturas anuales de patudo durante 1976-2005. En general, las capturas en el OPO y en el Pacífico occidental y central han aumentado, pero con fluctuaciones considerables. Las capturas en el OPO alcanzaron 105 mil t en 1986, y desde entonces han fluctuado entre unas 73 y 147 mil t, con la mayor captura reportada en 2000. En el Pacífico occidental y central, las capturas de patudo aumentaron a más de 77 mil t a fines de la década de 1970, disminuyeron en los años 1980, y luego aumentaron, con fluctuaciones menores, hasta 1999, cuando llegaron a más de 118 mil t. La captura récord de patudo en esa región, unas 122 mil t, ocurrió en 2002.

Antes de 1994 la captura retenida media anual de patudo por buques cerqueros en el OPO fue alrededor de 9 mil t (rango: 1 a 22 mil t) (Tabla A-2a). Con el desarrollo de dispositivos agregadores de peces (plantados) colocados en el agua por los pescadores para atraer atunes, las capturas retenidas anuales de patudo aumentaron a 35 mil t en 1994 a entre 45 y 64 mil t durante 1995-1999, y a un récord de 94 mil t en 2000. La estimación preliminar de la captura retenida en el OPO en 2005 es de 70 mil t. Los descartes medios anuales de patudo en el mar durante 1993-2005 se cifraron en un 5% de la captura cerquera de la especie (rango: 2 a 9%). Los buques cañeros capturaron pequeñas cantidades de patudo (Tabla A-2a).

Durante el período de 1975-1993, antes del incremento en el uso de plantados y las mayores capturas cer-

queras de patudo resultantes, las capturas palangreras constituían, en promedio, un 88% de las capturas retenidas de esta especie en el EPO. Entre 1994 y 2004 las capturas anuales retenidas de las pesquería palangreras oscilaron entre unas 36 y 74 mil t (promedio: 55 mil t), en promedio un 45% de la captura total de patudo en el OPO (Tabla A-2a). La estimación preliminar de la captura en el OPO en 2005 es de 32 mil t (Tabla A-2a).

Se capturan pequeñas cantidades de patudo con otros tipos de arte (Tabla A-2a).

En la Sección D del presente informe se presenta mayor información sobre el atún patudo.

1.1.4. Atún aleta azul

En la Tabla A-5 y la Figura E-1 se presentan las capturas de aleta azul del Pacífico en el Océano Pacífico entero, por bandera y arte. Los datos, obtenidos del Comité Científico Internacional sobre los Atunes y Especies Afines en el Océano Pacífico Norte (ISC) y son desglosados por nación o entidad pesquera, sin tener en cuenta la región del Pacífico donde fue capturado el pescado.

En la Tabla A-2a se presentan las capturas de atún aleta azul del Pacífico en el OPO durante 1976-2005, por arte de pesca. Durante 1990-2004 la captura anual retenida de la especie en el OPO por buques cerqueros y cañeros fue en promedio 3 mil t (rango: 400 t a 9 mil t). La estimación preliminar de la captura retenida de aleta azul en 2005, 9 mil t, es mil t más que el promedio de 1990-2004. Pequeñas cantidades de aleta azul son descartadas en el mar por buques cerqueros (Tabla A-2a).

En la Sección E del presente informe se presenta información sobre el atún aleta azul del Pacífico.

1.1.5. Atún albacora

En la Tabla A-6 y en las Figuras F-1a-b se presentan las capturas de albacora en el Océano Pacífico entero, por arte y zona (al norte y al sur de la línea ecuatorial). En la Tabla A-2a se presentan las capturas de albacora en el OPO, por arte de pesca. Una porción importante de la captura de la especie es tomada con curricán, incluido en otras artes (OTR) en la Tabla A-2a. Los datos de capturas fueron obtenidos de datos de la CIAT en el caso del OPO, y de datos compilados por la SPC en el caso del Pacífico occidental y central.

En la Sección F del presente informe se presenta información sobre el atún albacora.

1.2. Otros atunes y especies afines

Los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo forman el componente más importante de las capturas retenidas de la flota cerquera y cañera en el OPO, pero otros atunes y especies afines, como el barrilete negro, bonito, peto, y las melvas, contribuyen a la captura general de la región. En la Tabla A-2a se presentan estimaciones de las capturas anuales retenidas y descartadas de estas especies durante 1976-2005. Las capturas incluidas en la categoría de atunes no identificados (TUN) en la Tabla A-2a contienen algunas capturas reportadas por especie (melvas o petos) junto con los atunes no identificados. La captura retenida total de estas otras especies en estas pesquerías fue de unas 2 mil toneladas en 2005, menos que el promedio de 1990-2004 de unas 5 mil t (rango: >1 a 20 mil t).

El barrilete negro es también capturado con otras artes en el OPO, principalmente en la pesca artesanal costera. El bonito es asimismo capturado en las pesquerías artesanales, y ha sido reportado como captura por buques palangreros en algunos años.

1.3. Peces picudos

En la Tabla A-2b y las Figuras G-1, H-1 e I-1 se presentan datos de captura de los peces picudos (pez espada, marlín azul, negro, rayado y trompa corta, y pez vela).

El pez espada es capturado en el OPO con palangres a gran escala y artesanales, red de transmalle, arpón y, de vez en cuando, por buques deportivos. La captura palangrera anual media de pez espada durante 1990-2004 fue 13 mil t, pero durante 2001-2004 unas 18 mil t. No queda claro si esto se debe a un au-

mento del esfuerzo dirigido hacia la especie.

Los demás peces picudos son capturados con palangres a gran escala y artesanales y por artes deportivas. Las capturas palangreras anuales medias de marlín azul y marlín rayado durante 1990-2004 fueron unas 5 mil y 3 mil t, respectivamente. Se capturan cantidades menores de otros peces picudos con palangre.

Desgraciadamente, se cuenta con muy poca información sobre las capturas deportivas de peces picudos, pero se cree que son sustancialmente menores que las capturas comerciales de todas estas especies.

Se capturan pequeñas cantidades de peces picudos con red de cerco, pero se consideran éstas descartadas, aunque es posible que parte de esta captura sea descargada sin ser reportada. Se incluyen estos datos en la Tabla A-2b.

En las Secciones G-I del presente informe se presenta información sobre las poblaciones del pez espada, marlín azul, y marlín rayado.

1.4. Otras especies

En la Tabla A-2c se presentan datos de las capturas y descartes de carángidos (jureles y salmón), dorado, elasmobranquios (tiburones y rayas) y otros peces capturados en el OPO.

Las capturas de dorado son descargadas principalmente en puertos de América Central y del Sur. Aunque en algunos años se capturas más que 10 mil t de la especie, rara vez se informa del tipo de arte.

1.5. Distribución de las capturas de atunes

1.5.1. Capturas cerqueras

En las Figuras A-1a, A-2a, y A-3a ilustran las distribuciones anuales medias de las capturas de aleta amarilla, barrilete y patudo, por tipo de lance, por buques cerqueros en el OPO durante 1990-2004 (1994-2004 en el caso del patudo), y en las Figuras A-1b, A-2b, y A-3b estimaciones preliminares para 2005. Las capturas de aleta amarilla fueron bajas en las zonas del norte frente a México y Centroamérica en 2005, al igual que en 2004. Fueron mayores en el sur entre 10° y 20°S en el primer semestre del año. La distribución de las capturas de barrilete en 2005 fue similar a las de 1990-2004, aunque, al igual que en 2004, las capturas en las zonas costeras de México fueron mayores, debido posiblemente a cambios en la estrategia de pesca motivados por la mala pesca de aleta amarilla. Aumentaron asimismo las capturas de barrilete en las zonas costeras frente a Sudamérica. No se captura a menudo patudo al norte de aproximadamente 7°N. Las capturas de la especie disminuyeron en las zonas costeras de América del Sur en 2004 y 2005. Con el desarrollo de la pesquería sobre plantados, arriba descrita, la importancia relativa de las zonas cerca de la costa ha disminuido, mientras que la de las zonas de altura ha aumentado.

1.5.2. Capturas palangreras

Las bases de datos de la CIAT contienen datos sobre las distribuciones espacial y temporal de las capturas en el OPO de las flotas palangreras de aguas lejanas de China, la República de Corea, España, Estados Unidos, Japón, Polinesia Francesa, Taipei Chino, y Vanuatu. Los atunes patudo y aleta amarilla forman la mayor parte de las capturas de la mayoría de estos buques. En la Figura A-4 se ilustra la distribución de las capturas de atunes de estas dos especies por buques palangreros japoneses en el Océano Pacífico durante 2000-2004. Se presentan datos de la pesquería palangrera japonesa en el OPO durante 1956-1997 en los Boletines de la CIAT que describen esa pesquería.

1.6. Composición por tamaño de las capturas de atunes

1.6.1. Capturas de las pesquerías cerquera, cañera y deportiva

Las muestras de frecuencia de talla son la fuente básica de los datos usados para estimar la composición por talla y edad de las distintas especies de peces en las descargas. Esta información es necesaria para obtener estimaciones de la composición de las poblaciones por edad, usadas para varios propósitos, entre ellos el modelado integrado que el personal ha usado en los últimos años. Los resultados de estudios de

este tipo han sido descritos en diversos Boletines de la CIAT, en sus Informes Anuales desde 1954, y en sus Informes de Evaluación de Poblaciones.

Las muestras de frecuencia de talla de aleta amarilla, barrilete, patudo, aleta azul del Pacífico y, ocasionalmente, barrilete negro de las capturas de buques cerqueros, cañeros, y deportivos en el OPO son tomadas por el personal de la CIAT en puertos de descarga en Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, y Venezuela. El muestreo de las capturas de aleta amarilla y barrilete fue iniciado en 1954, el de aleta azul en 1973, y el de patudo en 1975, y continúa actualmente.

En el Informe Anual de la CIAT de 2000 y el Informe de Evaluación de Stocks 4 de la CIAT se describen los métodos de muestreo de las capturas de atún. En breve, se selecciona para el muestreo pescado en las bodegas de buques cerqueros y cañeros solamente si todo el pescado en la bodega fue capturado durante un solo mes, en un solo tipo de lance (delfín, objeto flotante, o no asociado), y en la misma zona de muestreo. Se clasifican estos datos por pesquería (Figura A-5), con base en las evaluaciones más recientes de las poblaciones realizadas por el personal.

En este informe se presentan datos de peces capturados durante 2000-2005. Para cada especie, excepto el aleta azul y el barrilete negro, se presentan dos histogramas de frecuencia de talla: el primero presenta los datos por estrato (arte de pesca, tipo de lance, y zona) para 2005, y el segundo ilustra los datos combinados para cada año del período de 2000-2005. En el caso del aleta azul, se ilustran las capturas comerciales y deportivas de 2000-2005 combinadas. En el caso del barrilete negro, los histogramas ilustran las capturas por artes comerciales durante 2000-2005. Hubo muy poca captura por buques cañeros en 2005, y se obtuvieron solamente cuatro muestras de los mismos.

Para la evaluación de las poblaciones de aleta amarilla se definen nueve pesquerías de cerco (cuatro asociadas con objetos flotantes, tres asociadas con delfines, dos de atunes no asociados) y una de caña (Figura A-5). La última abarca todas las 13 zonas de muestreo. De las 789 bodegas muestreadas, 603 contenían aleta amarilla. En la Figura A-6a se ilustran las composiciones por talla estimadas del pescado capturado durante 2005. La mayoría de la captura de aleta amarilla provino de lances sobre atunes asociados con delfines. Los peces de mayor tamaño (>100 cm) fueron capturados durante el primer semestre del año en la pesquería sobre delfines del Sur, y en los trimestres segundo a cuarto en la pesquería sobre delfines del Norte. Fueron capturados peces más grandes en la pesquería sobre delfines costera también, principalmente en el tercer trimestre. Fue evidente una moda de aleta amarilla más pequeño (60 cm) en la pesquería no asociada en el Norte y en el Sur durante el primer semestre del año; hubo pescado más pequeño en las pesquerías sobre objetos flotantes durante el año entero. Fueron capturadas pequeñas cantidades de aleta amarilla en las pesquerías sobre objetos flotantes durante todo el año. Las capturas de los buques cañeros fueron insignificantes.

En la Figura A-6b se ilustra la composición por talla estimada del aleta amarilla capturado por todas las pesquerías combinadas durante 2000-2005. El peso medio del aleta amarilla capturado en 2005 fue el más bajo desde 1999.

Para la evaluación de las poblaciones de barrilete se definen siete pesquerías de cerco (cuatro asociadas con objetos flotantes, dos de atunes no asociados, una asociada con delfines) y una de caña (Figura A-5). Las dos últimas abarcan todas las 13 zonas de muestreo. De las 789 bodegas muestreadas, 627 contenían barrilete. En la Figura A-7a se ilustran las composiciones por talla estimadas del pescado capturado durante 2005. La mayoría de la captura de barrilete durante el primer trimestre de 2005 provino de lances no asociados en la zona Sur. Durante el segundo trimestre continuaron las capturas grandes de barrilete en lances no asociados en la zona Sur, y las capturas en los lances sobre objetos flotantes aumentaron también de forma importante en todas las zonas. Las capturas de barrilete en los lances no asociados durante el tercer trimestre aumentaron en el Norte, pero disminuyeron en el Sur. Continuaron las capturas importantes de barrilete en los lances sobre objetos flotantes, excepto en la zona Sur, donde disminuyeron durante el tercer trimestre. En el cuarto trimestre las capturas de barrilete disminuyeron en el Norte en los lances no asociados, mientras que en la zona Sur aumentaron en los lances sobre objetos flotantes y no

asociados. El barrilete tomado en la pesquería asociada con delfines fue capturado principalmente durante el segundo trimestre. Los buques cañeros capturaron cantidades insignificantes de barrilete.

En la Figura A-7b se ilustra la composición por talla estimada del barrilete capturado por todas las pesquerías combinadas durante 2000-2005. Los peces más pequeños (40-50 cm) fueron capturados principalmente en los trimestres primero y cuarto de 2004, y los más grandes (>55 cm) principalmente en el segundo trimestre de ese año.

Para la evaluación de las poblaciones de patudo se definen seis pesquerías de cerco (cuatro asociadas con objetos flotantes, una de atunes no asociados, una asociada con delfines) y una de caña (Figura A-5). Las tres últimas abarcan todas las 13 zonas de muestreo. De las 789 bodegas muestreadas, 209 contenían patudo. En la Figura A-8a se ilustran las composiciones por talla estimadas del pescado capturado durante 2005. En 2000 la mayor parte de la captura provino de lances sobre objetos flotantes en la zona Ecuatorial, pero desde 2001 hasta 2003 provino de lances sobre objetos flotantes en la zona Sur. En 2005, al igual que en 2004, las pesquerías sobre objetos flotantes en las zonas Norte, Ecuatorial, y Sur capturaron cantidades casi iguales de patudo. Se capturaron pequeñas cantidades de patudo en lances no asociados, en lances sobre objetos flotantes en la zona Costera, y en lances sobre atunes asociados con delfines. No se registró captura de patudo por barcos cañeros.

En la Figura A-8b se ilustra la composición por talla estimada del patudo capturado por todas las pesquerías combinadas durante 2000-2005. El peso medio del pescado fue máximo en 2000, cuando se logró la mayor captura de patudo jamás registrada. Desde 2002 el peso promedio del patudo ha sido bastante constante. Los patudos pequeños (40-60 cm) fueron capturados principalmente en lances sobre objetos flotantes durante el año entero, mientras que la mayoría de los peces más grandes fue capturada durante el cuarto trimestre en lances sobre objetos flotantes en las zonas Ecuatorial y Sur.

El aleta azul del Pacífico es capturado con red de cerco y con artes deportivas frente a California y Baja California, entre 23°N y 35°N, aproximadamente, principalmente entre mayo y octubre. Durante 2005 fue capturado entre 26°N y 31°N desde mayo hasta agosto. La mayor parte de las capturas comerciales y deportivas fue lograda en julio y agosto. Previamente se reportaban las capturas comercial y deportiva por separado, pero en 2004 y 2005 el pequeño tamaño de las muestras imposibilita la estimación de capturas y composición por talla por separado. Se combinaron por tanto las capturas comercial y deportiva de aleta azul para cada año del período de 2000-2005. En la Figura A-9 se presentan las composiciones por talla estimadas. La captura comercial fue mucho mayor que la deportiva, pero esta última estimación es muy preliminar.

El barrilete negro es capturado incidentalmente por pescadores que dirigen su esfuerzo hacia los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo. La demanda de la especie es baja, y la mayoría de la captura es desechada en el mar, pero a veces se retienen pequeñas cantidades, mezcladas con las especies más deseadas. En 2005 se tomaron 15 muestras de barrilete negro; en la Figura A-10 se ilustra la composición estimada por talla de la especie.

1.6.2. Capturas palangreras

En las Figuras A-11 y A-12 se ilustra la composición estimada por talla de las capturas de aleta amarilla y patudo por la pesquería palangrera japonesa en el OPO durante 2000-2004. El peso promedio de ambas especies en dicha pesquería ha sido la misma durante toda su historia. En los Boletines de la CIAT que describen esta pesquería se presenta información sobre la composición por talla del pescado capturado en el OPO durante 1958-1997.

1.7. Capturas de atunes y bonitos, por bandera y arte

En las Tablas A-3a-e se detallan las capturas retenidas anuales de atunes y bonitos en el OPO durante 2001-2005, clasificadas por bandera y arte. Las tablas incluyen todas las capturas conocidas de atunes, compiladas de registros obtenidos de gobiernos, compañías procesadoras de pescado, cuadernos de bitácora, y registros de importaciones y exportaciones. En el [sitio web de la CIAT](#) se presenta información

similar de años anteriores a 2001 sobre los atunes y bonitos, y datos históricos de atunes, peces picudos, tiburones, carángidos, dorado, y peces misceláneos. En las Tablas A-4a-b (recuadro superior) se resumen las capturas cerqueras, cañeras y deportivas de atunes y bonitos en 2004 y 2005, por bandera.

1.8. Descargas de atunes y bonitos por buques de cerco y caña

Las descargas representan pescado descargado de buques pesqueros en el año correspondiente, sin tener en cuenta el año de captura. El país de descarga es aquél en el cual el pescado fue descargado o, en el caso de transbordos, el que recibió el pescado transbordado. Datos de descarga preliminares de 2004 y 2005 (Tablas A-4a-b, recuadro inferior) señalan que, de las 606 mil t de atunes y bonitos descargadas en 2005, el 52% fue descargado en Ecuador y el 24% en México. Otros países con descargas importantes de atunes y bonitos capturados en el OPO incluyeron Colombia (7%), y Costa Rica y Venezuela (3%). Es importante notar que cuando se disponga de información final, las descargas asignadas ahora a varios países podrían cambiar debido a la exportación de pescado almacenado a procesadoras en otros países.

1.9. Capturas cerqueras por metro cúbico de volumen de bodega


En la Tabla A-7 se presenta la captura retenida total en el OPO, por metro cúbico de volumen de bodega (C/m^3) de los buques cerqueros que pescan atunes en el OPO, por clase de arqueo y especie, durante 2000-2005. Para que este índice sea más detallado de lo que es posible con las seis clases de arqueo usadas históricamente por la CIAT, se clasifica la flota en ocho clases de arqueo. La C/m^3 de los buques mayores consiste principalmente de aleta amarilla, barrilete, y patudo, mientras que las otras especies de atunes, como el barrilete negro, forman una parte importante de la C/m^3 de los buques más pequeños en muchos años.

2. ESFUERZO

2.1. Pesca de cerco

Los atunes son capturados con redes de cerco en tres tipos de cardúmenes: asociados con delfines, con objetos flotantes (naturales y plantados), y no asociados con nada excepto otros peces. En la Tabla A-8 se presentan estimaciones del número de lances cerqueros de cada tipo en el OPO durante 1988-2005 y de las capturas retenidas de esos lances (figura). Se calcularon las estimaciones para los buques de las Clases 1 a 5 con datos de bitácora en la base de datos estadística de la CIAT, y aquéllos para los buques de la Clase 6 a partir de las bases de datos de observadores de la CIAT y de los programas de observadores de la CIAT, Ecuador, Estados Unidos, México, la Unión Europea y Venezuela. El número de lances sobre atunes asociados con objetos flotantes y no asociados fue máximo entre mediados de los años 1970 y principios de los 1980. A pesar de la oposición a la pesca de atunes asociados con delfines, y de la decisión de las enlatadoras de EE.UU. de no comprar atún capturado en viajes en los cuales se realizaron lances sobre delfines, el número de lances sobre delfines disminuyó tan sólo moderadamente a mediados de los años 1990, y en 2003 fue el mayor jamás registrado.

Hay dos tipos de objetos flotantes, los “naturales” (que



Capturas cerqueras de atunes, por especie y tipo de lance, 1987-2005

también incluyen desperdicios y otros objetos artificiales), que se encuentran en el mar por casualidad, del punto de vista de los pescadores, y los que son construidos por pescadores con el propósito específico de atraer peces. Se conocen estos últimos como dispositivos agregadores de peces (DAP), plantados, o FAD (del inglés *fish-aggregating device*). Hace unos doce años que se usan extensamente los plantados, y su importancia relativa ha aumentado en ese período, mientras que la de los objetos “naturales” ha disminuido, tal como indican los datos en la Tabla A-9.

2.2. Pesca palangrera

En la Tabla A-10 se presentan el esfuerzo, en número total de anzuelos, dirigido hacia todas las especies, y las capturas anuales reportadas de las especies principales de atunes por los buques palangreros en el OPO. Los datos de China, Estados Unidos, Japón, Polinesia Francesa, la República de Corea (1987-2004 solamente), y Taipei Chino representan la captura y el esfuerzo totales, mientras que aquéllos de México, Panamá, la República de Corea (1975-1986), y Vanuatu, que fueron compilados de datos de bitácora, no representan los totales.

3. LAS FLOTAS

3.1. Las flotas de cerco y de caña


La CIAT mantiene registros detallados del arte de pesca, bandera, y capacidad de acarreo de la mayoría de los buques que pescan atunes aleta amarilla, barrilete, patudo, y/o aleta azul del Pacífico con red de cerco o caña en el OPO. La flota aquí descrita incluye buques cerqueros y cañeros que pescaron estas cuatro especies en el OPO durante el año entero o parte del mismo.

Históricamente, se usaron las estimaciones de la capacidad de acarreo de buques individuales provistas por el armador o astillero, en toneladas de pescado, hasta que los registros de descarga indicasen que era preciso modificarlas. Se agruparon los buques, de acuerdo a su capacidad de acarreo, originalmente en toneladas cortas y luego en toneladas métricas, en seis clases de capacidad.

Desde 2000, el personal de la CIAT usa el volumen de bodegas, en metros cúbicos (m^3), en lugar de peso, en toneladas (t), para medir la capacidad de acarreo de los buques. Ya que la densidad de carga de pescado en una bodega puede variar, medir la capacidad de acarreo en peso es subjetivo, ya que un cargamento de pescado metido en una bodega a densidad alta pesa más que uno cargado a densidad menor. El uso de volumen como medida de capacidad elimina este problema.

El personal de la CIAT comenzó a reunir datos sobre la capacidad en volumen en 1999, pero todavía no ha obtenido esta información para todos los buques. En el caso de buques para los cuales no se dispone de información fidedigna sobre el volumen de bodega, se convirtió la capacidad estimada en toneladas en metros cúbicos.

Hasta aproximadamente 1960 predominaron en la pesca atunera en el OPO los buques cañeros, que faenaban en zonas costeras y cerca de islas y bancos de alta mar. Hacia fines de los años 1950 y a principios de los 1960, la mayoría de los buques cañeros grandes fue convertida a arte de cerco, y para 1961 este arte predominaba en la pesquería del OPO. Entre 1961 y 2005 el número de buques cañeros se redujo de 93 a 4, y su volumen total disminuyó de unos 11.000 m^3 a unos 500 m^3 . Durante el mismo período el número de cerqueros aumentó de 125 a 219, y su volumen total de bodega de



Capacidad de acarreo, en metros cúbicos de volumen de bodega, de las flotas cerquera y cañera en el OPO, 1961-2005


unos 32.000 m³ a 213.000 m³, un promedio de unos 973 m³ por buque. Previamente ocurrió un pico en el número y volumen total de bodega de la flota cerquera entre mediados de los años 1970 y principios de los 1980, cuando llegó a haber 282 buques, y el volumen total de bodega alcanzó unos 195.000 m³, un promedio de unos 691 m³ por buque (Tabla A-11 y figura).

Las tasas de captura en el OPO fueron bajas durante 1978-1981, debido a la concentración del esfuerzo de pesca sobre peces pequeños, y la situación se vio agravada por un evento importante de El Niño que comenzó a mediados de 1982 y persistió hasta fines de 1983, y que causó que los peces fueran menos vulnerables a la captura. Luego disminuyó el volumen total de bodegas, debido al retiro de buques o a su traslado a otras zonas de pesca, principalmente el Pacífico occidental, y en 1984 alcanzó el nivel más bajo desde 1971, unos 125.000 m³. A principios de 1990 la industria enlatadora de Estados Unidos decidió no comprar más atún capturado en viajes en los que se pescaran atunes asociados con delfines. Esto llevó a que muchas embarcaciones de Estados Unidos abandonasen el OPO, y a una disminución consecuente en la flota a 119.000 m³ en 1992. Con la mayor participación de buques de otras naciones en la pesquería, el volumen total de bodega ha aumentado progresivamente desde 1992, y en 2005 fue de unas 213.000 m³.

En las Tablas A-12a-b se presentan los datos finales de 2004 y preliminares de 2005 del número y volumen total de bodega de los buques cerqueros y cañeros que pescaron atunes en el OPO. En 2005 predominaron las flotas de Ecuador y México (26% del volumen total de bodega cada uno), seguidos por Venezuela (16%), Panamá (15%), Colombia (7%), Nicaragua (4%), y España y El Salvador (3% cada uno).

Buques de la Clase 6 formaron un 91% del volumen total de bodega de la flota cerquera en el OPO durante 2005. En la figura se compara la capacidad acumulativa en el mar durante 2005 con los cuatro años anteriores.

En la Tabla A-13 se presentan los valores mensuales medios, mínimos, y máximos del volumen total de bodega en el mar (VEM), en miles de m³, de los buques cerqueros y cañeros que pescaron atunes en el OPO durante 1995-2004, junto con los valores de 2005. Los valores mensuales son los promedios de las estimaciones de la VEM calculadas semanalmente por el personal de la CIAT. La pesca fue reglamentada en algunos de los últimos cuatro meses del año durante 1998-2005, por lo que los valores de la VEM para septiembre-diciembre de 2005 no son comparables con los valores medios del período correspondiente durante 1995-2004. Durante 1995-2004 y 2005 el valor medio del VEM fue 102 mil m³ (59% de la capacidad total) y 136 mil m³ (64% de la capacidad total), respectivamente.



Capacidad acumulativa de la flota cerquera y cañera en el mar, por mes, 2001-2005

3.2. Otras flotas del OPO

El Registro Regional de Buques de la CIAT, disponible en el [sitio web de la Comisión](#), contiene información sobre otros tipos de buques que pescan atunes en el OPO. El Registro es incompleto para buques pequeños; incluye registros de buques palangreros grandes (>24 m) de algunas naciones que pescan en el OPO y en otras zonas.




FIGURE A-1a. Average annual distributions of the purse-seine catches of yellowfin, by set type, 1990-2004. The sizes of the circles are proportional to the amounts of yellowfin caught in those 5° by 5° areas.
FIGURA A-1a. Distribución media anual de las capturas cerqueras de aleta amarilla, por tipo de lance, 1990-2004. El tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de aleta amarilla capturado en la cuadrícula de 5° x 5° correspondiente.




FIGURE A-1b. Average annual distributions of the purse-seine catches of yellowfin, by set type, 2005. The sizes of the circles are proportional to the amounts of yellowfin caught in those 5° by 5° areas.
FIGURA A-1b. Distribución media anual de las capturas cerqueras de aleta amarilla, por tipo de lance, 2005. El tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de aleta amarilla capturado en la cuadrícula de 5° x 5° correspondiente.




FIGURE A-2a. Average annual distributions of the purse-seine catches of skipjack, by set type, 1990-2004. The sizes of the circles are proportional to the amounts of skipjack caught in those 5° by 5° areas.
FIGURA A-2a. Distribución media anual de las capturas cerqueras de barrilete, por tipo de lance, 1990-2004. El tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de barrilete capturado en la cuadrícula de 5° x 5° correspondiente.




FIGURE A-2b. Average annual distributions of the purse-seine catches of skipjack, by set type, 2005. The sizes of the circles are proportional to the amounts of skipjack caught in those 5° by 5° areas.
FIGURA A-2b. Distribución media anual de las capturas cerqueras de barrilete, por tipo de lance, 2005. El tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de barrilete capturado en la cuadrícula de 5° x 5° correspondiente.




FIGURE A-3a. Average annual distributions of the purse-seine catches of bigeye, by set type, 1994-2004. The sizes of the circles are proportional to the amounts of bigeye caught in those 5° by 5° areas.

FIGURA A-3a. Distribución media anual de las capturas cerqueras de patudo, por tipo de lance, 1994-2004. El tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de patudo capturado en la cuadrícula de 5° x 5° correspondiente.




FIGURE A-3b. Average annual distributions of the purse-seine catches of bigeye, by set type, 2005. The sizes of the circles are proportional to the amounts of bigeye caught in those 5° by 5° areas.

FIGURA A-3b. Distribución media anual de las capturas cerqueras de patudo, por tipo de lance, 2005. El tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de patudo capturado en la cuadrícula de 5° x 5° correspondiente.






FIGURE A-4. Distribution of the catches of bigeye and yellowfin tunas in the Pacific Ocean, in metric tons, by the Japanese longline fleet, 2000-2004. The sizes of the circles are proportional to the amounts of bigeye and yellowfin caught in those 5° by 5° areas.

FIGURA A-4. Distribución de las capturas de atunes patudo y aleta amarilla en el Océano Pacífico, en toneladas métricas, por la flota palangrera japonesa, 2000–2004. El tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de patudo y aleta amarilla capturado en la cuadrícula de 5° x 5° correspondiente.


Unassociated – Bigeye, bluefin
 Dolphin – Bigeye, skipjack
 Pole-and-line vessels – All species
 No asociado – Patudo y aleta azul
 Delfín – Patudo y barrilete
 Barcos cañeros – Todas especies



Floating objects – All species
 Objetos flotantes – Todas especies



Unassociated – Skipjack, yellowfin
 No asociado – Barrilete y aleta amarilla



Dolphin – Yellowfin
 Delfín – Aleta amarilla




FIGURE A-5. The fisheries defined by the IATTC staff for stock assessment of yellowfin, skipjack, and bigeye in the EPO. The thin lines indicate the boundaries of the 13 length-frequency sampling areas, and the bold lines the boundaries of the fisheries.

FIGURA A-5. Las pesquerías definidas por el personal de la CIAT para la evaluación de las poblaciones de atún aleta amarilla, barrilete, y patudo en el OPO. Las líneas delgadas indican los límites de las 13 zonas de muestreo de frecuencia de tallas, y las líneas gruesas los límites de las pesquerías.




FIGURE A-6a. Estimated size compositions of the yellowfin caught in each fishery of the EPO during 2005. The average weights of the fish in the samples are given at the tops of the panels.

FIGURA A-6a. Composición por tallas estimada del aleta amarilla capturado en cada pesquería del OPO en 2005. En cada recuadro se detalla el peso promedio de los peces en las muestras.




FIGURE A-6b. Estimated size compositions of the yellowfin caught by purse-seine and pole-and-line vessels in the EPO during 2000-2005. The average weights of the fish in the samples are given at the tops of the panels.

FIGURA A-6b. Composición por tallas estimada del aleta amarilla capturado por buques cerqueros y cañeros en el OPO durante 2000-2005. En cada recuadro se detalla el peso promedio de los peces en las muestras.




FIGURE A-7a. Estimated size compositions of the skipjack caught in each fishery of the EPO during 2005. The average weights of the fish in the samples are given at the tops of the panels.

FIGURA A-7a. Composición por tallas estimada del barrilete capturado en cada pesquería del OPO en 2005. En cada recuadro se detalla el peso promedio de los peces en las muestras.




FIGURE A-7b. Estimated size compositions of the skipjack caught by purse-seine and pole-and-line vessels in the EPO during 2000-2005. The average weights of the fish in the samples are given at the tops of the panels.

FIGURA A-7b. Composición por tallas estimada del barrilete capturado por buques cerqueros y cañeros en el OPO durante 2000-2005. En cada recuadro se detalla el peso promedio de los peces en las muestras.




FIGURE A-8a. Estimated size compositions of the bigeye caught in each fishery of the EPO during 2005. The average weights of the fish in the samples are given at the tops of the panels.

FIGURA A-8a. Composición por tallas estimada del patudo capturado en cada pesquería del OPO en 2005. En cada recuadro se detalla el peso promedio de los peces en las muestras.




FIGURE A-8b. Estimated size compositions of the bigeye caught by purse-seine vessels in the EPO during 2000-2005. The average weights of the fish in the samples are given at the tops of the panels.
FIGURA A-8b. Composición por tallas estimada del patudo capturado por buques cerqueros en el OPO durante 2000-2005. En cada recuadro se detalla el peso promedio de los peces en las muestras.




FIGURE A-9. Estimated catches of Pacific bluefin by purse-seine and recreational gear in the EPO during 2000-2005. The values at the tops of the panels are the average weights.

FIGURA A-9. Captura estimada de aleta azul del Pacífico por buques cerqueros y deportivos en el OPO durante 2000-2005. El valor en cada recuadro representa el peso promedio.




FIGURE A-10. Estimated size compositions of the catches of black skipjack by purse-seine vessels in the EPO during 2000-2005. The values at the tops of the panels are the average weights.

FIGURA A-10. Composición por tallas estimada del barrilete negro capturado por buques cerqueros en el OPO durante 2000-2005. El valor en cada recuadro representa el peso promedio.




FIGURE A-11. Estimated size compositions of the catches of yellowfin tuna by the Japanese longline fishery in the EPO, 2000-2004.

FIGURA A-11. Composición por tallas estimada de las capturas de atún aleta amarilla por la pesquería palangrera japonesa en el OPO, 2000-2004.




FIGURE A-12. Estimated size compositions of the catches of bigeye tuna by the Japanese longline fishery in the EPO, 2000-2004.

FIGURA A-12. Composición por tallas estimada de las capturas de atún patudo por la pesquería palangrera japonesa en el OPO, 2000-2004.

TABLE A-1. Annual catches of yellowfin, skipjack, and bigeye, by all types of gear combined, in the Pacific Ocean, 1976-2005. The EPO totals for 1993-2005 include discards from the purse-seine fishery.

TABLA A-1. Capturas anuales de aleta amarilla, barrilete, y patudo, por todas las artes combinadas, en el Océano Pacífico, 1976-2005. Los totales del OPO de 1993-2005 incluyen descartes de la pesquería de cerco.

	YFT			SKJ			BET			Total		
	EPO	WCPO	Total	EPO	WCPO	Total	EPO	WCPO	Total	EPO	WCPO	Total
1976	234,371	150,420	384,791	136,926	351,305	488,231	71,586	77,131	148,717	442,883	578,856	1,021,739
1977	199,381	180,986	380,367	94,111	397,122	491,233	85,250	76,600	161,850	378,743	654,708	1,033,451
1978	173,995	173,400	347,395	179,675	441,081	620,756	89,198	58,562	147,760	442,868	673,043	1,115,911
1979	187,136	193,011	380,147	141,504	405,334	546,838	67,533	66,072	133,605	396,173	664,417	1,060,590
1980	158,848	211,867	370,715	138,109	450,964	589,073	86,404	64,986	151,390	383,361	727,817	1,111,178
1981	178,516	224,983	403,499	126,003	430,566	556,569	68,340	53,402	121,742	372,859	708,951	1,081,810
1982	127,536	220,833	348,369	104,669	478,530	583,199	60,346	58,778	119,124	292,551	758,141	1,050,692
1983	100,011	256,285	356,296	62,149	669,530	731,679	64,754	59,502	124,256	226,914	985,317	1,212,231
1984	149,478	252,381	401,859	63,612	741,721	805,333	55,273	63,591	118,864	268,364	1,057,693	1,326,057
1985	226,036	258,320	484,356	52,002	595,188	647,190	72,404	68,466	140,870	350,442	921,974	1,272,416
1986	286,148	249,934	536,082	67,748	739,330	807,078	105,119	63,586	168,705	459,016	1,052,850	1,511,866
1987	286,360	303,342	589,702	66,465	675,087	741,552	101,314	77,796	179,110	454,139	1,056,225	1,510,364
1988	296,633	262,310	558,943	92,126	830,499	922,625	74,304	66,201	140,505	463,064	1,159,010	1,622,074
1989	299,736	313,545	613,281	98,931	808,975	907,906	72,994	74,954	147,948	471,661	1,197,474	1,669,135
1990	302,284	354,236	656,520	77,120	871,736	948,856	104,806	88,941	193,747	484,209	1,314,913	1,799,122
1991	266,089	396,979	663,068	65,895	1,097,666	1,163,561	109,116	69,841	178,957	441,099	1,564,486	2,005,585
1992	253,712	419,746	673,458	87,354	1,029,426	1,116,780	91,999	86,380	178,379	433,064	1,535,552	1,968,616
1993	256,674	387,185	643,859	100,521	904,890	1,005,411	82,834	77,113	159,947	440,029	1,369,188	1,809,217
1994	248,248	393,841	642,089	84,642	1,007,795	1,092,437	109,327	85,240	194,567	442,217	1,486,876	1,929,093
1995	244,601	374,355	618,956	150,670	1,043,816	1,194,486	108,207	76,662	184,869	503,477	1,494,833	1,998,310
1996	266,463	309,396	575,859	132,932	1,020,470	1,153,402	114,704	78,367	193,071	514,099	1,408,233	1,922,332
1997	278,264	430,729	708,993	188,530	967,161	1,155,691	122,346	104,334	226,680	589,140	1,502,224	2,091,364
1998	280,139	462,991	743,130	165,673	1,295,914	1,461,587	93,946	109,025	202,971	539,757	1,867,930	2,407,687
1999	304,939	416,024	720,963	292,070	1,151,145	1,443,215	93,280	118,087	211,367	690,289	1,685,256	2,375,545
2000	288,960	428,978	717,938	231,911	1,220,529	1,452,440	147,539	106,907	254,446	668,411	1,756,414	2,424,825
2001	423,548	419,700	843,248	159,422	1,131,183	1,290,605	131,443	106,383	237,826	714,414	1,657,266	2,371,680
2002	442,835	406,002	848,837	167,185	1,275,783	1,442,968	132,802	122,345	255,147	742,822	1,804,130	2,546,952
2003	413,147	443,001	856,148	302,417	1,290,767	1,593,184	116,690	112,788	229,478	832,254	1,846,556	2,678,810
2004	288,287	407,509	695,796	216,668	1,369,838	1,586,506	109,594	116,259	225,853	614,549	1,893,606	2,508,155
2005	275,048	*	275,048	281,650	*	281,650	104,275	*	104,275	660,973	*	660,973

TABLE A-2a. Estimated retained catches, by gear type, and estimated discards (purse-seine only), of tunas and bonitos, in metric tons, in the EPO, 1976-2005. The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimate and are preliminary. The data for 2004-2005 are preliminary.

TABLA A-2a. Estimaciones de las capturas retenidas, por arte de pesca, y de los descartes (red de cerco únicamente), de atunes y bonitos, en toneladas métricas, en el OPO, 1976-2005. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a la estimación de composición por especie, y son preliminares. Los datos de 2004-2005 son preliminares.

	Yellowfin—Aleta amarilla (YFT)						Skipjack—Barrilete (SKJ)						Bigeye—Patudo (BET)					
	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total
	Ret.	Dis.					Ret.	Dis.					Ret.	Dis.				
1976	215,106		3,280	15,632	353	234,371	124,958		11,256	130	583	136,926	17,214		75	54,290	7	71,586
1977	184,922		1,841	12,355	263	199,381	84,606		7,521	112	1,872	94,111	11,162		2	74,086	0	85,250
1978	158,800		3,887	10,188	1,120	173,995	172,293		6,048	61	1,273	179,675	18,539			70,659	0	89,198
1979	170,648		4,790	11,473	225	187,136	133,695		6,345	33	1,430	141,504	12,097			55,435	1	67,533
1980	143,042		1,480	13,477	849	158,848	130,912		5,226	26	1,945	138,109	21,939			64,335	130	86,404
1981	168,235		1,477	7,999	805	178,516	119,165		5,906	20	911	126,003	14,922			53,416	2	68,340
1982	114,754		1,538	10,961	283	127,536	100,498		3,760	28	383	104,669	6,939		42	53,365	0	60,346
1983	83,928		4,007	10,894	1,182	100,011	56,851		4,387	28	883	62,149	4,575		39	60,043	97	64,754
1984	135,785		2,991	10,345	357	149,478	59,859		2,884	32	838	63,612	8,860		2	46,394	17	55,273
1985	211,460		1,069	13,198	309	226,036	50,829		946	44	182	52,002	6,056		2	66,325	21	72,404
1986	260,512		2,537	22,807	292	286,148	65,635		1,921	57	135	67,748	2,685			102,425	9	105,119
1987	262,007		5,107	18,911	335	286,360	64,019		2,233	38	176	66,465	1,177			100,121	16	101,314
1988	277,293		3,723	14,659	958	296,633	87,113		4,325	26	663	92,126	1,535		5	72,758	6	74,304
1989	277,995		4,145	17,032	564	299,736	94,935		2,941	28	1,027	98,931	2,031			70,963	0	72,994
1990	263,251		2,675	34,634	1,724	302,284	74,370		824	41	1,885	77,120	5,920			98,871	15	104,806
1991	231,257		2,856	30,729	1,247	266,089	62,229		1,717	33	1,916	65,895	4,870		31	104,194	21	109,116
1992	228,121		3,789	18,526	3,276	253,712	84,283		1,956	24	1,091	87,354	7,179			84,799	21	91,999
1993	219,494	4,722	4,950	23,808	3,700	256,674	83,829	10,588	3,772	62	2,271	100,521	9,657	645		72,473	59	82,834
1994	208,409	4,691	3,625	29,545	1,978	248,248	70,127	10,472	3,240	73	730	84,642	34,900	2,261		71,359	808	109,327
1995	215,434	5,275	1,268	20,054	2,570	244,601	127,045	16,378	5,253	77	1,917	150,670	45,319	3,251		58,256	1,381	108,207
1996	238,606	6,314	3,761	16,426	1,356	266,463	103,976	24,837	2,555	52	1,512	132,932	61,312	5,689		46,957	746	114,704
1997	244,878	5,516	4,418	21,448	2,004	278,264	153,456	31,558	3,260	135	121	188,530	64,270	5,482		52,571	23	122,346
1998	253,959	4,718	5,084	14,212	2,166	280,139	140,631	22,856	1,684	294	208	165,673	44,128	2,853		46,347	617	93,946
1999	281,920	6,638	1,783	10,651	3,947	304,939	261,564	26,851	2,044	201	1,409	292,070	51,158	5,176		36,405	541	93,280
2000	254,928	6,796	2,431	22,771	2,034	288,960	205,130	26,415	231	68	67	231,911	94,115	5,649		47,506	269	147,539
2001	382,023	7,808	3,916	28,475	1,326	423,548	144,059	13,233	448	1,214	468	159,422	61,404	1,294		68,698	47	131,443
2002	412,389	4,019	950	23,873	1,604	442,835	153,394	12,625	616	251	299	167,185	57,457	937		74,396	12	132,802
2003	380,582	5,338	470	22,462	4,295	413,147	275,042	23,302	638	600	2,835	302,417	54,137	2,260		60,272	21	116,690
2004	269,918	2,853	1,884	10,196	3,436	288,287	198,067	16,420	528	515	1,138	216,668	67,179	1,612		40,614	189	109,594
2005	268,156	3,142	2,067	128	1,555	275,048	260,268	18,909	1,039	16	1,418	281,650	70,294	1,899	*	32,082	*	104,275

TABLE A-2a. (continued)
 TABLA A-2a. (continuación)

	Pacific bluefin—Aleta azul del Pacífico (PBF)						Albacore—Albacore (ALB)						Black skipjack—Barrilete negro (BKJ)					
	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total
	Ret.	Dis.					Ret.	Dis.					Ret.	Dis.				
1976	10,621		22	13	3	10,659	271		3,456	2,506	16,975	23,208	1,497		28			1,525
1977	5,449		10	11	34	5,504	15		1,960	10,578	11,471	24,024	1,445		11	1	1	1,458
1978	5,387		4	9	8	5,408	157		1,577	11,939	17,436	31,109	2,167		3			2,170
1979	6,102		5	6	20	6,133	148		179	5,583	5,043	10,953	1,336		30			1,366
1980	2,909			0	30	2,939	194		407	5,319	5,649	11,569	3,653		30			3,683
1981	1,086			4	9	1,099	99		608	7,275	12,301	20,283	1,907		3			1,910
1982	3,145			7	11	3,163	355		198	8,407	3,562	12,522	1,338					1,338
1983	836			2	35	873	7		449	7,433	7,840	15,729	1,222		0		13	1,235
1984	839		0	3	68	910	3,910		1,441	6,712	9,794	21,857	663				3	666
1985	3,996			1	113	4,110	42		877	7,268	6,654	14,841	289		0		7	296
1986	5,040			1	66	5,107	47		86	6,450	4,701	11,284	568				18	586
1987	980			3	55	1,038	1		320	9,994	2,662	12,977	571				1	572
1988	1,380			2	51	1,433	17		271	9,934	5,549	15,771	956				311	1,267
1989	1,102		5	4	124	1,235	1		21	6,784	2,695	9,501	803		0		0	803
1990	1,430		61	12	93	1,596	39		170	6,536	4,105	10,850	787				4	791
1991	419			5	94	518			834	7,894	2,754	11,482	421				25	446
1992	1,928			21	118	2,067			255	17,081	5,740	23,076	104				3	107
1993	580	0		11	331	922		0	1	11,194	4,410	15,605	104	4,116			31	4,251
1994	969	0		12	121	1,102		0	85	10,390	10,154	20,629	188	834			40	1,062
1995	630	0		25	264	919		0	465	6,184	7,427	14,076	202	1,448			0	1,650
1996	8,223	0		19	79	8,321	11	0	72	7,631	8,398	16,112	704	2,304			12	3,020
1997	2,608	3	2	14	256	2,883	1	0	59	9,678	7,540	17,278	101	2,512			11	2,624
1998	1,772	0	0	94	504	2,370	42	0	81	12,635	13,158	25,916	490	1,876	39		0	2,405
1999	2,553	54	5.0	152	552	3,316	46	0.0	227	11,633	14,510	26,416	171	3,424			0	3,595
2000	3,712	0	61	46	374	4,193	71	0	86	9,663	13,453	23,273	294	1,877			0	2,171
2001	891	3	1	148	389	1,432	3	0	156	19,410	13,727	33,296	2,260	1,253			0	3,513
2002	1,709	6	3	71	358	2,147	31	0	381	15,283	14,433	30,128	1,458	2,207	8		0	3,673
2003	3,233	0	3	88	751	4,075	33	0	59	24,855	20,397	45,344	433	1,606	6	13	117	2,175
2004	8,880	19		16	63	8,978	104	0.0	125	16,121	21,885	38,235	883	351		27	862	2,123
2005	3,830	14		*	95	3,939	0	0	18	42	73	133	1,446	1,909			0	3,355

TABLE A-2a. (continued)
 TABLA A-2a. (continuación)

	Bonito (BZX)						Unidentified tunas—Atunes no identificados (TUN)						Scombrids—Escómbridos TOTAL					
	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total
	Ret.	Dis.					Ret.	Dis.					Ret.	Dis.				
1976	4,312		44		299		97		0	0	4,981	5,078	374,076		18,161	72,571	23,201	488,008
1977	10,983		292		2,875		21		0	0	5,782	5,803	298,603		11,637	97,143	22,298	429,682
1978	4,801		35		2,419		188		0	0	6,677	6,865	362,331		11,554	92,856	28,933	495,675
1979	1,801		3		2,658		558		0	0	3,016	3,574	326,385		11,352	72,530	12,393	422,660
1980	6,089		36		2,727		442		0	0	836	1,278	309,180		7,179	83,157	12,166	411,681
1981	5,690		27		4,609		214		3	0	1,109	1,326	311,319		8,024	68,714	19,746	407,803
1982	2,122		0		6,776		52		0	0	382	434	229,204		5,538	72,768	11,397	318,907
1983	3,827		2		7,291		82		0	0	4,711	4,793	151,328		8,884	78,400	22,052	260,664
1984	3,514		0		7,291		7		0	0	2,524	2,531	213,437		7,318	63,486	20,892	305,133
1985	3,599		5		7,869		18		0	0	678	696	276,290		2,899	86,836	15,833	381,858
1986	232		258		1,889		177		4	0	986	1,167	334,897		4,806	131,740	8,096	479,539
1987	3,196		121		1,781		479		0	0	2,043	2,522	332,430		7,781	129,067	7,069	476,345
1988	8,811		739		947		258		0	0	2,939	3,197	377,363		9,062	97,379	11,424	495,228
1989	11,278		818		465		469		0	0	621	1,090	388,613		7,930	94,811	5,496	496,851
1990	13,641		215		371		373		0.00	0	692	1,065	359,811		3,945	140,094	8,889	512,739
1991	1,207		82		242		4		0.00	0	192	196	300,407		5,520	142,855	6,491	455,273
1992	977		0		318		120		0	2	1,071	1,193	322,711		6,001	120,453	11,638	460,803
1993	599	12	1		436	1,048	12	2,288	0	2	4,082	6,384	314,275	22,370	8,724	107,550	15,320	468,238
1994	8,331	147	362		185	9,025	9	1,279	0	0	464	1,752	322,932	19,683	7,312	111,379	14,480	475,787
1995	7,929	55	81		54	8,119	12	1,394	0	1	1,004	2,411	396,572	27,800	7,067	84,597	14,617	530,652
1996	647	1	7		16	671	36	1,756	0	1	1,038	2,831	413,514	40,900	6,395	71,086	13,157	545,053
1997	1,097	4	8		34	1,143	75	4,580	0	1	1,437	6,093	466,486	49,655	7,747	83,847	11,426	619,161
1998	1,330	4	7		588	1,929	15	2,294	0	3	18,158	20,470	442,367	34,601	6,896	73,585	35,399	592,847
1999	1,719	0	0	24	369	2,112	29	3,470	0	2,107	4,279	9,885	599,160	45,614	4,059	61,173	25,607	735,613
2000	636	0.0	0	75	56	767	190	2,191	0	1,987	1,468	5,836	559,076	42,929	2,809	82,116	17,721	704,651
2001	18	0	0	34	19	71	206	2,806	0	2,322	1	5,335	590,864	26,398	4,521	120,301	15,977	758,061
2002	0	0	0	42	1	43	577	3,408	0	2,791	0	6,776	627,015	23,202	1,958	116,707	16,707	785,589
2003	0	0	1		25	26	81	2,537	0	172	750	3,540	713,541	35,044	1,177	108,462	29,191	887,415
2004	14	47	0	8	2	71	256	2,783	0	3,261	258	6,558	545,301	24,086	2,537	70,758	27,833	670,515
2005	313	18		*	*	331	180	4,092	0	2,036	*	6,308	604,487	29,983	3,124	34,304	3,141	675,039

TABLE A-2b. Estimated retained catches, by gear type, and estimated purse-seine discards, of billfishes, in metric tons, in the EPO, 1976-2005. Data for 2004-2005 are preliminary. PS dis = discards by purse-seine vessels.

TABLA A-2b. Estimaciones de las capturas retenidas, por arte de pesca, y de los descartes (red de cerco únicamente), de peces picudos, en toneladas métricas, en el OPO, 1976-2005. Los datos de 2004-2005 son preliminares. PS dis = descartes por buques cerqueros.

	Swordfish—Pez espada (SWO)				Blue marlin—Marlín azul (BUM)				Black marlin—Marlín negro (BLM)				Striped marlin—Marlín rayado (MLS)			
	PS dis.	LL	OTR	Total	PS dis.	LL	OTR	Total	PS dis.	LL	OTR	Total	PS dis.	LL	OTR	Total
1976		3,489	363	3,852		3,240		3,240		253		253		6,432		
1977		4,298	788	5,086		3,016		3,016		621		621		3,145		
1978		4,103	2,205	6,308		3,570		3,570		417		417		2,495		
1979		2,658	614	3,272		4,528		4,528		332		332		4,137		
1980		3,746	1,107	4,853		4,016		4,016		335		335		4,827		
1981		3,070	1,134	4,204		4,476		4,476		247		247		4,876		
1982		2,604	1,551	4,155		4,745		4,745		213		213		4,711		
1983		3,341	2,338	5,679		4,459		4,459		240		240		4,472		
1984		2,752	3,336	6,088		5,197		5,197		248		248		2,662		
1985		1,885	3,768	5,653		3,588		3,588		180		180		1,599		
1986		3,286	3,294	6,580		5,278		5,278		297		297		3,540		
1987		4,676	3,740	8,416		7,282		7,282		358		358		7,647		
1988		4,916	5,642	10,558		5,662		5,662		288		288		5,283		
1989		5,202	6,072	11,274		5,392		5,392		193		193		3,473		
1990		5,807	5,066	10,873		5,540		5,540		223		223		3,260		
1991	17	10,564	4,414	14,995	69	6,462	257	6,788	58	246		304	76	2,805	188	76
1992	4	9,793	4,294	14,091	52	6,426	201	6,679	95	228		323	69	2,907	147	69
1993	6	6,167	4,434	10,607	56	6,279	292	6,627	64	217		281	35	3,332	243	3,610
1994	4	4,963	3,849	8,816	73	8,609	418	9,100	118	256		374	35	3,126	270	3,431
1995	6	4,466	3,003	7,475	83	6,944	344	7,371	82	158		240	21	2,943	306	3,270
1996	2	6,756	2,801	9,559	84	3,396	200	3,680	90	99		189	22	2,981	237	3,240
1997	6	9,508	2,853	12,367	134	5,468	340	5,942	124	153		277	25	4,201	272	4,498
1998	2	9,381	3,665	13,048	137	4,477	580	5,194	113	168		281	18	3,277	281	3,576
1999	3	7,470	2,064	9,537	188	3,010	680	3,878	138	94		232	31	2,287	334	2,652
2000	3	8,523	2,790	11,316	134	3,028	606	3,768	104	105		209	17	1,747	190	1,954
2001	5	15,404	2,615	18,024	163	3,554	643	4,360	138	123		261	20	1,693	274	1,987
2002	1	16,917	2,757	19,675	208	2,825	662	3,695	143	78		221	73	1,948	214	2,235
2003	6	17,881	640	18,527	187	3,213	876	4,276	160	71		231	31	1,787	139	1,957
2004	3	13,810	1,447	15,260	149	2,084	416	2,649	75	33		108	20	935	234	1,189
2005	3	199	77	279	423	*	*	423	100	*	*	100	32	*	*	32

TABLE A-2b. (continued)
 TABLA A-2b. (continuación)

	Shortbill spearfish—Marlín trompa corta (SSP)				Sailfish—Pez vela (SFA)				Unidentified Istiophorid billfishes—Picudos Istiofóridos no identificados (BIL)				Billfishes—Peces picudos TOTAL			
	PS dis.	LL	OTR	Total	PS dis.	LL	OTR	Total	PS dis.	LL	OTR	Total	PS dis.	LL	OTR	Total
1976						494		494						13,908	363	14,271
1977						753		753		15		15		11,848	788	12,636
1978						878		878		3		3		11,466	2,205	13,671
1979						251		251		6		6		11,912	614	12,526
1980						244		244		0		0		13,168	1,107	14,275
1981						379		379		9		9		13,057	1,134	14,191
1982						1,084		1,084		3		3		13,360	1,551	14,911
1983						890		890		2		2		13,404	2,338	15,742
1984						345		345						11,204	3,336	14,540
1985						395		395		1		1		7,648	3,768	11,416
1986		5		5		583		583		1		1		12,990	3,294	16,284
1987		15		15		649		649		398		398		21,025	3,740	24,765
1988		13		13		649		649		368		368		17,179	5,642	22,821
1989		0		0		192		192		51		51		14,503	6,072	20,575
1990						6		6		123		123		14,959	5,066	20,025
1991	0	1		1	40	10	707	757		112		112	260	20,200	5,566	26,026
1992	1	1		2	41	741	610	1,392		1,120		1,120	262	21,216	5,252	26,730
1993	0	1		1	36	1,145	1,121	2,302	24	1,650		1,674	221	18,791	6,090	25,102
1994	0	144		144	27	878	804	1,709	13	1,028		1,041	270	19,004	5,341	24,615
1995	0	155		155	31	237	1,114	1,382	8	232		240	231	15,135	4,767	20,133
1996	0	126		126	24	197	541	762	10	308	1	319	232	13,863	3,780	17,875
1997	1	141		142	28	799	418	1,245	4	1,324	0	1,328	322	21,594	3,883	25,799
1998	0	200		200	50	394	988	1,432	9	575	52	636	329	18,472	5,566	24,367
1999	1	278		279	42	107	1,109	1,258	9	1,135	0	1,144	412	14,381	4,187	18,980
2000	1	285		286	58	108	1,239	1,405	3	865	136	1,004	320	14,661	4,961	19,942
2001	0	304		304	37	134	1,289	1,460	6	1,298	204	1,508	369	22,510	5,025	27,904
2002	0	265		265	44	391	1,399	1,834	5	2,083	14	2,102	474	24,507	5,046	30,027
2003	1	289		290	105	145	1,012	1,262	4	1,189	0	1,193	494	24,575	2,667	27,736
2004	0	187		187	39	132	1,261	1,432	4	907	0	911	290	18,088	3,358	21,736
2005	1	*	*	1	45	17	*	62	7	353	0	360	611	569	77	1,257

TABLE A-2c. Estimated retained catches, by gear type, and estimated purse-seine discards, of other species, in metric tons, in the EPO, 1976-2005. Data for 2004-2005 are preliminary.

TABLA A-2c. Estimaciones de las capturas retenidas, por arte de pesca, y de los descartes (red de cerco únicamente), de otras especies, en toneladas métricas, en el OPO, 1976-2005. Los datos de 2004-2005 son preliminares.

	Unidentified carangids—Carángidos no identificados (CGX)					Dorado (<i>Coryphaena</i> spp.) (DOX)					Unidentified elasmobranchs—Elasmobranquios no identificados (SKX)					Unidentified fishes—Peces no identificados (MZZ)									
	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total	PS		LP	LL	OTR	Total	
	Ret.	Dis.					Ret.	Dis.					Ret.	Dis.					Ret.	Dis.					Ret.
1976	483				483	124		9		963	1,096	307		10		141	458	291		3				294	
1977	1,099				1,099	167		0		827	994	233				34	267	429						429	
1978	238		1		239	87				738	825	145			390	535	148							148	
1979	81		0		81	124				927	1,051	7		17	1,290	1,314	478				7			485	
1980	224		2		226	124		0		1,001	1,125	16		7	858	881	301							301	
1981	111		17		128	410				628	1,038	49		120	1,211	1,380	201		3		51			255	
1982	122				122	274				980	1,254	22		30	215	864	1,131	284				59			343
1983	1,240				1,240	88				3,374	3,462	34			85	695	814	267		1					268
1984	414				414	103				202	305	47			6	1,039	1,092	415				3			418
1985	317		4		321	93				108	201	27			13	481	521	78				7			85
1986	188		19		207	632				1,828	2,460	29			1	1,979	2,009	91							91
1987	566		5		571	271				4,272	4,543	96			87	1,020	1,203	210				535			745
1988	825		1		826	69				1,560	1,629	1			23	1,041	1,065	141				360			501
1989	60		2		62	210				1,680	1,890	29			66	1,025	1,120	237				152			389
1990	234		0		235	63				1,491	1,554	0			1	1,095	1,096	240				260	13		513
1991	116			0	116	57			7	613	677	1		6	73	1,346	1,426	463		1		457			921
1992	116			0	116	69			37	708	814				311	1,190	1,501	445				182			627
1993	17	73			92	36	909		17	724	1,686	24	1,458		218	916	2,616	223	459	2	182				866
1994	7	47			70	279	1,571		46	3,459	5,355	113	1,166		893	1,314	3,486	10	362		251				623
1995	11	58			78	110	1,592		39	2,127	3,868	20	1,213		554	1,075	2,862		588		209				797
1996	55	230			342	119	1,902		43	183	2,247	3	1,176		521	2,151	3,851	5	358		455				818
1997	2	179			220	36	1,899		564	9,411	11,910	22	1,615		532	2,360	4,529	14	449		847				1,310
1998	57	214			275	15	1,293		39	11,656	13,003	6	1,649		686	4,484	6,825	65	1,032		1,338				2,435
1999	35	260	1		296	75	1,758			2,333	5,111	9,277		1,144	4,286	2,144	7,574	86	884		973				1,943
2000	57	160		4	225	109	2,164			3,534	1,041	6,848	3	1,027	6,732	405	8,167	1	284		1,359				1,644
2001		222		18	266	148	3,053			4,720	11,357	19,278		1,058	9,752	117	10,927	0	233		1,590				1,823
2002		180		15	215	45	2,690			3,916	7,966	14,617		1,069	7,951	3,752	12,772	0	198		1,745				1,943
2003		199		54	253	23	1,692			622	4,262	6,599		1,264	5,805	4,902	11,971	0	232		4,089				4,321
2004	0	213			213	99	2,274			1,395	6,735	10,503		992	4,981	2,187	8,160	14	312		97				423
2005	61	197		*	258	111	2,567			418	*	3,096		892	3,421	*	4,313	189	226		*				415

TABLE A-3a. Estimates of the retained catches of tunas and bonitos, by flag, gear type, and species, in metric tons, in the EPO, 2001. The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimates and are preliminary.

TABLA A-3a. Estimaciones de las capturas retenidas de atunes y bonitos, por bandera, arte de pesca, y especie, en toneladas métricas, en el OPO, 2001. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a la estimación de composición por especie, y son preliminares.

2001		YFT	SKJ	BET	PBF	ALB	BKJ	BZX	TUN	Total
BLZ	LL	1,833	1,080	1,987	131	4,854				9,885
CAN	LTL					4,600				4,600
CHL	NK	66		5		5		19		95
CHN	LL	942		2,639		1,581				5,162
COK	LTL					48				48
COL	PS	21,474	2,638	240			79			24,431
CRI	NK	1,133		28			0			1,161
ECU	NK			14					1	15
	PS	55,161	66,210	24,476			2,101		203	148,151
ESP	PS	9,439	22,733	9,439						41,611
JPN	LL	14,808	28	38,048	2	1,889				54,775
KOR	LL	5,230	29	12,576	10	355				18,200
MEX	LL	30		1						31
	LP	3,916	448			17		0		4,381
	PS	130,327	7,905	19	863	0		18		139,132
PAN	LL	732	26	80		28				866
	PS	10,422	6,178	3,329						19,929
PYF	LL	846	14	684		3,542				5,086
TWN	LL	3,928	36	9,285		6,811				20,060
USA	GN	5	1		34			0		40
	LL	29	1	118	5	56			1	210
	LP				1	139				140
	LTL					7,439				7,439
	RN	45								45
	PS	4,773	4,363	3,325	28	3	60			12,552
	RG	76	467		355	1,635				2,533
VEN	PS	111,038	1,162				2			112,202
VUT	LL	13		3,277		294				3,584
	PS	9,499	8,205	5,624						23,328
OTR ¹	LL ²	85		3				34	2,321	2,443
	PS ³	29,890	24,665	14,952			18		3	69,528

¹ This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies—Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

² Includes El Salvador, Guatemala and Nicaragua—Incluye El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

³ Includes Belize, Bolivia, China, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Unknown—Incluye Belice, Bolivia, China, Desconocido, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

TABLE A-3b. Estimates of the retained catches of tunas and bonitos, by flag, gear type, and species, in metric tons, in the EPO, 2002. The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimates and are preliminary.

TABLA A-3b. Estimaciones de las capturas retenidas de atunes y bonitos, por bandera, arte de pesca, y especie, en toneladas métricas, en el OPO, 2002. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a las estimaciones de composición por especie, y son preliminares.

2002		YFT	SKJ	BET	PBF	ALB	BKJ	BZX	TUN	Total
BLZ	LL	1,447		1,459	67	438				3,411
CAN	LTL					4,753				4,753
CHL	NK	15		7		40		0		62
CHN	LL	1,457		7,614		1,327				10,398
COK	LTL					27				27
COL	PS	30,578	2,530	290					284	33,682
CRI	NK	1,563	20							1,583
ECU	NK			5						5
	PS	29,594	81,203	27,914			876		85	139,672
ESP	PS	5,165	19,761	7,849						32,775
JPN	LL	8,530	66	34,300	2	2,630				45,528
KOR	LL	3,626	44	10,358	1	341				14,370
MEX	GN	1								1
	LL	4			1					5
	LP	950	616		1	0	8			1,575
	PS	151,556	7,919	10	1,709	28	358			161,580
PAN	LL	761	49	2		4				816
	PS	20,767	6,882	2,386			5			30,040
PYF	LL	278	27	388		2,545				3,238
SLV	PS	3,220	5,778	6,624						15,622
TWN	LL	7,360	64	17,253		7,096				31,773
USA	GN	1			7			1		9
	LL	5	1	20		0			1	27
	LP				2	381				383
	LTL					7,256				7,256
	PS	8,738	3,276	2,535		3	214		194	14,960
	RG	24	279		351	2,357				3,011
VEN	PS	121,800	2,627							124,427
VUT	LL	290		2,995		902				4,187
	PS	5,687	6,085	2,769						14,541
OTR ¹	LL ²	115		7				42	2,790	2,954
	PS ³	35,284	17,333	7,080			5		14	59,716

¹ This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies—Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

² Includes El Salvador, Guatemala and Nicaragua—Incluye El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

³ Includes Belize, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru and Unknown—Incluye Belice, Bolivia, Desconocido, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.

TABLE A-3c. Estimates of the retained catches of tunas and bonitos, by flag, gear type, and species, in metric tons, in the EPO, 2003. The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimates and are preliminary.

TABLA A-3c. Estimaciones de las capturas retenidas de atunes y bonitos, por bandera, arte de pesca, y especie, en toneladas métricas, en el OPO, 2003. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a las estimaciones de composición por especie, y son preliminares.

2003		YFT	SKJ	BET	PBF	ALB	BKJ	BZX	TUN	Total
BLZ	LL	353		604	42	600				1,599
CAN	LTL					6,295				6,295
CHL	LL						13			13
	NK	73		14		1		24		112
CHN	LL	2,739		10,066		1,743				14,548
COK	LTL					251				251
COL	PS	19,351	5,872	250						25,473
CRI	NK	2,819	18							2,837
ECU	LL	148	293							441
	NK		93							93
	PS	31,174	139,814	25,606			62		38	196,694
ESP	LL			58						58
	PS	4,162	26,881	7,655						38,698
JPN	LL	9,266	49	25,428	3	2,116				36,862
KOR	LL	4,911	25	10,272		343				15,551
MEX	LL	365			43					408
	LP	468	637				6			1,111
	PS	169,664	10,841	369	3,211	28	192			184,305
PAN	PS	27,420	12,658	4,481			3	10		44,572
PER	NK	806	2,575				117	750		4,248
PYF	LL	462	60	346		3,233		144		4,245
TWN	LL	3,477	172	12,016		12,663				28,328
USA	GN		9	6	14	16		1		46
	LL	5	1	224		24			4	258
	LP	2	1		3	59		1		66
	LTL					11,622				11,622
	PS	1,012	7,695	2,694	22	3	163		25	11,614
	RG	597	140	1	737	2,212				3,687
VEN	PS	90,705	12,782	26						103,513
VUT	LL	699		1,258		4,133				6,090
	PS	3,258	19,786	6,313			13			29,370
OTR ¹	LL ²	37							24	61
	PS ³	33,836	38,713	6,743		2			8	79,302

¹ This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies—Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

² Includes Nicaragua and Panama—Incluye Nicaragua y Panamá.

³ Includes Belize, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru, and Unknown—Incluye Belice, Bolivia, Desconocido, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú.

TABLE A-3d. Preliminary estimates of the retained catches of tunas and bonitos, by flag, gear type, and species, in metric tons, in the EPO, 2004. The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimates and are preliminary.

TABLA A-3d. Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atunes y bonitos, por bandera, arte de pesca, y especie, en toneladas métricas, en el OPO, 2004. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a las estimaciones de composición por especie, y son preliminares.

2004		YFT	SKJ	BET	PBF	ALB	BKJ	BZX	TUN	Total
BLZ	LL	190	26	120		296				632
CAN	LTL					7,676				7,676
CHL	LL	86		9		8	27	8		138
CHN	LL	798		2,645		590				4,033
COK	LTL					99				99
CRI	NK	2,014	22							2,036
ECU	LL			312						312
	NK			185						185
	PS	36,973	86,283	32,356			97	7	8	155,724
ESP	LL			5						5
HND	PS	1,073	3,798	1,763					1	6,635
JPN	LL	6,450	91	18,509	2	2,204				27,256
KOR	LL			10,729						10,729
MEX	LL	32			14					46
	LP	1,882	528							2,410
	PS	92,899	22,701		8,880	104	417	7	54	125,062
NIC	LL	43								43
PAN	LL								3,084	3,084
	PS	31,758	21,284	10,853			25		2	63,922
PER	NK	262	1,098				862		258	2,480
PYF	LL	767	56	405		1,802			143	3,173
TWN	LL	1,824	339	7,384		9,988				19,535
URY	LL								31	31
USA	GN	1			10	9		2		22
	LL	6	3	157		8			3	177
	LP	2				125				127
	LTL					12,595				12,595
	NK					1,506				1,506
	PS	2,565	5,347	3,555			296		178	11,941
	RG	1,159	18	4	53					1,234
VEN	PS	54,999	13,647	1,001			47		1	69,695
VUT	LL			339		1,225				1,564
	PS	1,648	8,766	4,911						15,325
OTR ¹	PS ²	48,003	36,241	12,740			1		12	96,997

¹ This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies—Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

² Includes Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Spain and Unknown—Incluye Bolivia, Colombia, Desconocido, El Salvador, España, Guatemala y Nicaragua.

TABLE A-3e. Preliminary estimates of the retained catches of tunas and bonitos, by flag, gear type, and species, in metric tons, in the EPO, 2005. The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimates and are preliminary.

TABLA A-3e. Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atunes y bonitos, por bandera, arte de pesca, y especie, en toneladas métricas, en el OPO, 2005. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a las estimaciones de composición por especie, y son preliminares.

2005		YFT	SKJ	BET	PBF	ALB	BKJ	BZX	TUN	Total
BLZ	LL	127	16	56		42				241
CHN	LL			972						972
COK	LTL					71				71
ECU	LL			39						39
	PS	44,896	128,987	33,392			112	40	18	207,445
HND	PS	2,073	6,107	3,601						11,781
JPN	LL			14,398						14,398
KOR	LL			9,590						9,590
MEX	LL	1								1
	LP	2,067	1,039							3,106
	PS	115,297	27,527	2	3,830		1,192	273	92	148,213
NIC	PS	6,497	2,805	33						9,335
PAN	LL								2,036	2,036
	PS	27,810	31,762	12,724			8		8	72,312
PER	OTR	708	1,398							2,106
SLV	PS	6,439	5,955	985			73		60	13,512
TWN	LL			6,129						6,129
USA	LL			158						158
	LP					18				18
	NK					2				2
	RG	847	20		95					962
VEN	PS	38,941	15,948	172			41		2	55,104
VUT	LL			740						740
OTR ¹	PS ²	26,203	41,177	19,385			20			86,785

¹ This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies—Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

² Includes Colombia, Guatemala, Spain, United States, Unknown and Vanuatu—Incluye Colombia, Desconocida, España, Estados Unidos, Guatemala y Vanuatu.

TABLE A-4a Preliminary estimates of the retained catches and landings, in metric tons, of tunas and bonitos caught by purse-seine, pole-and-line, and recreational vessels in 2004, by species and vessel flag (upper panel) and locations where processed (lower panel). The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimates and are preliminary.

TABLA A-4a. Estimaciones preliminares de las capturas retenidas y descargas de atunes y bonitos capturado por buques cerqueros, cañeros y deportivos en el OPO en 2004, por especie y bandera del buque (panel superior) y localidad donde fue procesado (panel inferior), en toneladas métricas. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a las estimaciones de composición por especie, y son preliminares.

	YFT	SKJ	BET	PBF	ALB	BKJ	BZX	TUN	Total	%
Retained catches–Capturas retenidas										
ECU	36,973	86,283	32,356	-	-	97	7	8	155,724	28.4
HND	1,073	3,798	1,763	-	-	-	-	1	6,635	1.2
MEX	94,781	23,229	-	8,880	104	418	8	54	127,474	23.2
PAN	31,758	21,284	10,853	-	-	25	-	2	63,922	11.6
USA	3,726	5,365	3,559	53	125	296	-	178	13,302	2.4
VEN	54,999	13,647	1,001	-	-	47	-	1	69,695	12.7
VUT	1,648	8,766	4,911	-	-	-	-	-	15,325	2.8
OTR ¹	48,003	36,241	12,740	-	-	1	-	12	96,997	17.7
Total	272,961	198,613	67,183	8,933	229	884	15	256	549,074	
Landings–Descargas										
COL	47,965	10,859	1,846	-	-	-	-	-	60,670	10.8
CRI	16,631	4,273	2,217	-	-	41	-	3	23,165	4.1
ECU	72,987	142,413	58,571	-	-	121	7	11	274,110	48.5
MEX	99,530	29,540	1,203	8,879	104	417	7	54	139,734	24.7
VEN	22,632	2,566	-	-	-	45	-	-	25,243	4.5
OTR ²	27,785	11,820	1,889	54	-	259	-	187	41,994	7.4
Total	287,530	201,471	65,726	8,933	104	883	14	255	564,916	

¹ Includes Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Spain and Unknown. This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies.

¹ Incluye Bolivia, Colombia, Desconocido, El Salvador, España, Guatemala y Nicaragua. Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

² Includes El Salvador, Guatemala, Peru, Spain and United States. This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies.

² Incluye El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala y Perú. Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

TABLE A-4b Preliminary estimates of the retained catches and landings, in metric tons, of tunas and bonitos caught by purse-seine, pole-and-line, and recreational vessels in the EPO in 2005, by species and vessel flag (upper panel) and locations where processed (lower panel). The purse-seine and pole-and-line data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimates and are preliminary.

TABLA A-4b. Estimaciones preliminares de las capturas retenidas y descargas de atunes y bonitos capturado por buques cerqueros, cañeros y deportivos en el OPO en 2005, por especie y bandera del buque (panel superior) y localidad donde fue procesado (panel inferior), en toneladas métricas. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo de las pesquerías cerquera y cañera fueron ajustados a las estimaciones de composición por especie, y son preliminares.

	YFT	SKJ	BET	PBF	ALB	BKJ	BZX	TUN	Total	%
Retained catches–Capturas retenidas										
ECU	44,896	128,987	33,392	-	-	112	40	15	207,442	34.1
HND	2,073	6,107	3,601	-	-	-	-	-	11,781	1.9
MEX	117,364	28,566	2	3,830	-	1,192	273	92	151,319	24.9
NIC	6,497	2,805	33	-	-	-	-	-	9,335	1.5
PAN	27,810	31,762	12,724	-	-	8	-	8	72,312	11.9
SLV	6,439	5,955	985	-	-	73	-	60	13,512	2.2
VEN	38,941	15,948	172	-	-	41	-	2	55,104	9.1
OTR ¹	27,050	41,197	19,385	95	18	20	-	-	87,765	14.4
Total	271,070	261,327	70,294	3,925	18	1,446	313	177	608,570	
Landings–Descargas										
COL	27,325	12,218	1,588	-	-	-	-	2	41,133	6.8
CRI	14,926	5,894	775	-	-	-	-	-	21,595	3.6
ECU	69,788	186,074	58,365	-	-	140	40	24	314,431	51.8
MEX	112,981	28,438	304	4,513	-	1,193	273	92	147,794	24.4
VEN	15,702	3,302	-	-	-	-	-	-	19,004	3.1
OTR ²	33,931	22,356	5,879	124	18	114	-	60	62,482	10.3
Total	274,653	258,282	66,911	4,637	18	1,447	313	178	606,439	

¹ Includes Colombia, Guatemala, Spain, United States, Unknown and Vanuatu. This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies.

¹ Incluye Colombia, Desconocido, España, Estados Unidos, Guatemala y Vanuatu. Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

² Includes El Salvador, Guatemala, Peru, Spain, United States and Unknown. This category is used to avoid revealing the operations of individual vessels or companies.

² Incluye Desconocido, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala y Perú. Se usa esta categoría para no revelar información sobre las actividades de buques o empresas individuales.

TABLE A-5. Annual retained catches of Pacific bluefin tuna, by gear type and flag, in metric tons. Source: Western and Central Pacific Fisheries Commission, International Scientific Committee, Report of the Fourth ISC Pacific Bluefin Tuna Working Group.

TABLA A-5. Capturas retenidas anuales de atún aleta azul del Pacífico, por arte de pesca y bandera, en toneladas métricas. Fuente: Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central, Comité Científico Internacional, Informe del Cuarto Grupo de Trabajo sobre el Atún Aleta Azul del Pacífico.

PBF	Western Pacific flags—Banderas del Pacífico occidental								Eastern Pacific flags—Banderas del Pacífico oriental					Total	
	JPN				KOR ¹		TWN		Sub-total	USA ²		MEX			Sub-total
	PS	LP	LL	OTR	PS	OTR	PS	LL		PS	OTR	PS	OTR		
1976	1,964	1,082	520	5,143				17	8,726	10,646	23	1,968		12,637	21,363
1977	3,960	2,256	712	5,519				131	12,577	5,473	21	2,186		7,680	20,257
1978	8,878	1,154	1,049	9,486				66	20,633	5,396	5	545		5,946	26,579
1979	12,266	1,250	1,223	9,418				58	24,215	6,118	12	213		6,343	30,558
1980	10,414	1,392	1,170	5,945				114	19,036	2,938	8	582		3,528	22,563
1981	23,219	754	796	6,428				179	31,376	867	21	218		1,106	32,482
1982	16,180	1,777	880	4,161	31		0	207	23,236	2,639	11	506		3,156	26,392
1983	14,105	356	707	3,883	13		0	175	19,239	629	155	214		998	20,237
1984	4,016	587	360	4,797	4		0	477	10,242	673	65	166		904	11,146
1985	4,239	1,817	496	5,475	1		0	210	12,237	3,320	210	676		4,206	16,443
1986	7,466	1,086	249	4,944	344		0	70	14,159	4,851	346	189		5,386	19,545
1987	7,771	1,565	346	3,536	89		0	365	13,672	861	135	119		1,115	14,787
1988	2,931	907	241	2,436	32		197	108	6,852	923	85	447	1	1,456	8,308
1989	5,624	754	440	1,977	71		259	205	9,330	1,046	135	57		1,238	10,568
1990	2,960	536	396	2,359	132		149	189	6,721	1,380	205	50		1,635	8,356
1991	8,217	286	285	3,994	265			342	13,389	410	68	9		487	13,876
1992	6,147	166	573	3,102	288		73	464	10,813	1,928	221			2,149	12,962
1993	5,675	129	857	1,645	40		4	471	8,820	580	217			797	9,617
1994	6,919	206	1,138	4,887	50			559	13,758	906	184	63	2	1,155	14,913
1995	15,978	307	769	6,715	821		2	335	24,928	689	215	10	0	914	25,842
1996	6,641	256	978	4,722	102			956	13,655	4,523	100	3,700		8,323	21,978
1997	11,123	71	1,383	3,859	1,054			1,814	19,304	2,240	175	367		2,782	22,086
1998	4,371	120	1,260	3,814	188			1,910	11,662	1,771	484	1		2,256	13,918
1999	13,440	124	1,155	4,483	256			3,089	22,547	184	482	2,369	35	3,070	25,617
2000	14,021	256	1,005	5,899	794		2	2,780	24,757	693	281	3,025	103	4,102	28,859
2001	6,727	332	1,004	5,089	995	10	104	1,839	16,100	149	273	863		1,285	17,385
2002	8,009	187	889	4,049	674	1	4	1,523	15,335	50	360	1,708	6	2,124	17,459
2003	5,680	59	1,230	1,950	1,591	0	21	1,863	12,395	22	246	3,211	46	3,525	15,920
2004	6,340	237	1,311	2,533	636	0	0	1,714	12,771	0	45	8,880	11	8,936	21,707
2005	3,090	604	870	1,870	950	0	0	1,366	8,749	165	56	3,830		221	8,970

¹ The catch statistics for the Republic of Korea were derived from Japanese import statistics, 1982-1999 (minimum estimates).—Las estadísticas de captura de la República de Corea fueron derivadas de estadísticas de importación japonesas, 1982-1999 (estimaciones mínimas)

² The catch statistics for United States were categorized into commercial fishing and sport fishing during 1975-1980.—Las estadísticas de captura de Estados Unidos fueron categorizadas en pesca comercial y pesca deportiva durante 1975-1980

TABLE A-6. Annual retained catches, in metric tons, of north and south Pacific albacore, by gear type. Compiled from IATTC data (EPO) and the ISC and SPC data (WCPO).

TABLA A-6. Capturas retenidas anuales, en toneladas métricas, de atún albacora del Pacífico norte y sur, por tipo de arte. Compiladas de datos de la CIAT (OPO) y del ISC y SPC (WCPO).

ALB	North Pacific Ocean Océano Pacífico Norte					South Pacific Ocean Océano Pacífico Sur					Total
	LL	LP	LTL	OTR	Subtotal	LL	LP	LTL	OTR	Subtotal	
1976	17,393	88,036	16,183	3,204	124,816	28,952	100	25	-	29,077	153,893
1977	17,097	33,431	10,022	2,249	62,799	38,014	100	621	-	38,735	101,534
1978	13,311	60,827	16,636	8,048	98,822	32,888	100	1,686	-	34,674	133,496
1979	14,555	44,965	7,302	4,182	71,004	26,157	100	814	-	27,071	98,075
1980	15,535	47,124	7,768	4,699	75,126	30,967	101	1,468	-	32,536	107,662
1981	18,549	28,174	12,837	11,482	71,042	32,693	0	2,085	5	34,783	105,825
1982	17,297	30,039	6,713	13,910	67,960	28,347	1	2,434	6	30,788	98,748
1983	15,565	21,705	9,584	7,673	54,527	24,309	0	744	39	25,092	79,619
1984	15,198	27,043	9,354	18,663	70,258	20,340	2	2,773	1,589	24,704	94,962
1985	14,642	22,212	6,471	14,845	58,170	27,138	0	3,253	1,937	32,328	90,498
1986	13,169	16,528	4,738	10,909	45,344	32,637	0	2,003	1,946	36,586	81,930
1987	15,401	19,240	2,870	11,475	48,986	21,969	9	2,134	930	25,042	74,028
1988	15,448	6,814	4,367	18,925	45,554	28,284	0	4,296	5,283	37,863	83,417
1989	13,543	8,683	2,000	19,913	44,140	18,224	0	8,370	21,968	48,562	92,702
1990	15,976	8,647	2,905	26,155	53,683	19,366	245	6,975	7,538	34,124	87,807
1991	17,374	7,103	1,984	10,791	37,253	23,385	14	7,805	1,489	32,693	69,946
1992	19,401	13,888	4,935	16,573	54,796	30,592	11	6,578	65	37,246	92,042
1993	30,443	12,797	6,748	4,079	54,067	30,230	74	4,296	70	34,670	88,737
1994	30,274	26,389	13,134	3,451	73,248	34,286	67	7,164	89	41,606	114,854
1995	34,678	21,061	10,758	1,700	68,197	29,380	139	7,708	104	37,331	105,528
1996	43,169	20,296	21,849	1017	86,506	23,862	57	7,367	156	31,442	117,948
1997	52,949	32,311	18,674	2,684	106,533	27,178	21	4,679	133	32,011	138,544
1998	51,639	23,005	20,074	3,179	97,967	37,828	47	6,258	85	44,218	142,185
1999	49,497	50,429	13,853	11,130	124,917	31,939	138	3,391	74	35,542	160,459
2000	43,497	21,618	15,245	4,585	85,692	33,980	102	6,120	139	40,341	126,033
2001	40,333	29,569	16,738	2,989	89,644	47,486	37	5,747	199	53,469	143,113
2002	32,943	48,832	16,323	6,188	104,292	58,095	18	4,738	152	63,003	167,295
2003	31,149	36,180	21,886	3,163	92,381	56,290	12	5,880	138	62,320	154,701
2004	23,409	32,441	22,323	7,900	86,107	50,306	78	5,139	59	55,582	141,689

TABLE A-7. Catches per cubic meter of well volume for the purse-seine fleet in the EPO, by species and vessel capacity group. All = YFT, SKJ, BET, PBF, ALB, BKJ, BZX, and TUN (see Table A-2a).

TABLA A-7. Capturas por metro cúbico de volumen de bodega de la flota cerquera en el OPO, por especie y clase de arqueo del buque. All = YFT, SKJ, BET, PBF, ALB, BKJ, BZX, y TUN (ver Tabla A-2a).

	Species — Especie	Well volume—Volumen de bodega (m ³)								
		<401	401-800	801-1100	1101-1300	1301-1500	1501-1800	1801-2100	>2100	Total
2000	YFT	1.8	0.9	1.0	2.2	1.4	1.7	0.6	0.5	1.5
	SKJ	2.5	1.5	1.8	0.5	0.9	0.7	1.4	1.4	1.1
	BET	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.2	1.0	1.5	0.4
	All	4.5	2.8	3.3	2.9	2.6	2.6	3.0	3.4	3.0
2001	YFT	2.3	1.4	1.4	3.0	2.1	2.5	0.8	0.6	2.0
	SKJ	1.2	1.0	1.0	0.2	0.5	0.4	1.3	1.2	0.7
	BET	0.0	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.6	0.5	0.2
	All	3.7	2.8	2.8	3.3	3.0	3.0	2.8	2.2	3.0
2002	YFT	1.6	1.6	1.0	3.3	2.8	2.3	0.7	0.5	2.0
	SKJ	1.3	1.3	1.0	0.3	0.5	0.2	1.3	1.4	0.8
	BET	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.2
	All	3.2	3.1	2.3	3.7	3.5	2.5	2.5	2.4	3.0
2003	YFT	1.7	1.8	1.1	3.0	2.1	2.0	0.8	0.6	1.9
	SKJ	2.9	2.4	1.8	0.6	0.9	0.4	1.8	1.3	1.3
	BET	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2
	All	4.9	4.4	3.2	3.7	3.2	2.5	3.1	2.4	3.5
2004	YFT	1.1	1.2	1.0	1.8	1.6	1.2	0.6	0.8	1.3
	SKJ	1.7	1.6	1.3	0.6	0.8	0.5	1.3	1.3	0.9
	BET	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.6	0.6	0.2
	All	3.1	3.0	2.8	2.6	2.6	1.8	2.4	2.7	2.6
2005	YFT	1.1	1.2	0.8	1.7	1.5	1.5	0.8	0.7	1.3
	SKJ	3.1	2.1	1.6	0.7	0.9	0.8	2.1	1.6	1.3
	BET	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.6	0.9	0.2
	All	4.5	3.5	2.8	2.5	2.6	2.4	3.4	3.3	2.9

TABLE A-8. Estimated numbers of sets, by set type and vessel size class, and estimated retained catches, in metric tons, of yellowfin, skipjack, and bigeye tuna in the EPO, by purse-seine vessels. The data for 2005 are preliminary. The data for yellowfin, skipjack, and bigeye tunas have been adjusted to the species composition estimate and are preliminary.

TABLA A-8. Números estimados de lances, por tipo de lance y clase de arqueo de los buques, y capturas retenidas estimadas, en toneladas métricas, de atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo en el OPO. Los datos de 2005 son preliminares. Los datos de los atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo fueron ajustados a la estimación de composición por especie, y son preliminares.

	Number of sets—Número de lances			Retained catch—Captura retenida		
	Class—Clase		Total	YFT	SKJ	BET
	1-5	6				
DEL	Sets on fish associated with dolphins Lances sobre peces asociados con delfines					
1988	49	11,160	11,209	153,936	5,392	37
1989	33	12,827	12,860	191,660	1,729	26
1990	31	10,997	11,028	173,893	1,351	0
1991	0	9,661	9,661	155,283	1,332	0
1992	26	10,398	10,424	165,647	1,262	0
1993	34	6,953	6,987	111,219	582	51
1994	5	7,804	7,809	125,486	1,096	1
1995	0	7,185	7,185	133,180	2,561	1
1996	14	7,472	7,486	138,595	1,753	57
1997	43	8,977	9,020	152,308	8,154	0
1998	0	10,645	10,645	154,734	4,982	5
1999	0	8,648	8,648	143,297	1,693	5
2000	0	9,235	9,235	147,562	541	15
2001	0	9,823	9,823	237,966	1,808	6
2002	0	12,446	12,446	301,388	3,180	2
2003	0	13,839	13,839	264,156	13,359	1
2004	0	11,783	11,783	176,160	10,801	3
2005	0	12,173	12,173	166,532	11,812	3
OBJ	Sets on fish associated with floating objects Lances sobre peces asociados con objetos flotantes					
1988	823	2,281	3,104	25,210	38,616	809
1989	974	2,339	3,313	28,383	44,684	1,527
1990	719	2,558	3,277	35,526	35,572	3,994
1991	819	2,165	2,984	25,501	39,049	2,747
1992	868	1,763	2,631	15,010	49,144	2,048
1993	493	2,063	2,556	19,304	53,079	6,125
1994	668	2,770	3,438	20,842	51,121	33,960
1995	707	3,521	4,228	21,097	80,049	41,964
1996	1,230	4,007	5,237	27,820	69,737	58,367
1997	1,699	5,653	7,352	30,051	116,792	62,703
1998	1,198	5,481	6,679	26,328	110,326	41,911
1999	630	4,620	5,250	43,052	181,650	49,326
2000	494	3,916	4,410	42,672	120,842	91,827
2001	697	5,744	6,441	66,317	122,987	60,623
2002	778	5,781	6,559	37,795	116,653	55,936
2003	694	5,497	6,191	29,765	181,553	52,345
2004	606	5,083	5,689	27,562	117,244	65,674
2005	614	5,128	5,742	28,070	131,672	68,892

TABLE A-8. (continued)
TABLA A-8 (continuación)

	Number of sets—Número de lances			Retained catch—Captura retenida		
	Class—Clase		Total	YFT	SKJ	BET
	1-5	6				
NOA	Sets on unassociated schools Lances sobre cardúmenes no asociados					
1988	4,147	7,536	11,683	98,147	43,105	689
1989	2,955	5,878	8,833	57,952	48,521	477
1990	3,683	5,397	9,080	53,832	37,447	1,926
1991	3,571	3,612	7,183	50,473	21,848	2,123
1992	4,010	4,079	8,089	47,463	33,876	5,130
1993	5,739	6,267	12,006	88,971	30,169	3,481
1994	5,440	5,064	10,504	62,081	17,910	938
1995	6,120	4,782	10,902	61,158	44,436	3,354
1996	5,807	5,118	10,925	72,191	32,486	2,888
1997	5,334	4,693	10,027	62,519	28,509	1,567
1998	5,700	4,631	10,331	72,897	25,323	2,213
1999	5,632	6,143	11,775	95,571	78,222	1,827
2000	6,119	5,482	11,601	64,695	83,747	2,273
2001	4,481	3,030	7,511	77,740	19,264	775
2002	5,008	3,409	8,417	73,205	33,561	1,520
2003	7,300	5,781	13,081	86,661	80,130	1,791
2004	4,932	5,083	10,015	66,196	70,022	1,502
2005	6,098	7,851	13,949	73,553	116,784	1,399
ALL	Sets on all types of schools Lances sobre todos tipos de cardumen					
1988	5,019	20,977	25,996	277,293	87,113	1,535
1989	3,962	21,044	25,006	277,995	94,935	2,031
1990	4,433	18,952	23,385	263,251	74,370	5,920
1991	4,390	15,438	19,828	231,257	62,229	4,870
1992	4,904	16,240	21,144	228,121	84,283	7,179
1993	6,266	15,283	21,549	219,494	83,829	9,657
1994	6,113	15,638	21,751	208,409	70,127	34,900
1995	6,827	15,488	22,315	215,434	127,045	45,319
1996	7,051	16,597	23,648	238,606	103,976	61,312
1997	7,076	19,323	26,399	244,878	153,456	64,270
1998	6,898	20,757	27,655	253,959	140,631	44,128
1999	6,262	19,411	25,673	281,920	261,564	51,158
2000	6,613	18,633	25,246	254,928	205,130	94,115
2001	5,178	18,597	23,775	382,023	144,059	61,404
2002	5,786	21,636	27,422	412,389	153,394	57,457
2003	7,994	25,117	33,111	380,582	275,042	54,137
2004	5,538	21,949	27,487	269,918	198,067	67,179
2005	6,712	25,152	31,864	268,156	260,268	70,294

TABLE A-9. Types of floating objects on which sets were made. The 2005 data are preliminary.

TABLA A-9. Tipos de objetos flotantes sobre los que se hicieron lances. Los datos de 2005 son preliminares.

OBJ	Flotsam Naturales		FADs Plantados		Unknown Desconocido		Total
	No.	%	No.	%	No.	%	
1992	1,087	61.7	556	31.5	120	6.8	1,763
1993	1,138	55.2	825	40.0	100	4.8	2,063
1994	773	27.9	1,899	68.6	98	3.5	2,770
1995	729	20.7	2,704	76.8	88	2.5	3,521
1996	537	13.4	3,447	86.0	23	0.6	4,007
1997	832	14.7	4,768	84.4	52	0.9	5,652
1998	752	13.7	4,627	84.4	102	1.9	5,481
1999	833	18.0	3,758	81.4	29	0.6	4,620
2000	488	12.5	3,381	86.3	47	1.2	3,916
2001	567	9.9	5,076	88.4	100	1.7	5,743
2002	756	13.1	4,953	85.8	66	1.1	5,775
2003	713	13.0	4,744	86.3	40	0.7	5,497
2004	590	11.6	4,469	87.9	24	0.5	5,083
2005	595	11.6	4,425	86.3	108	2.1	5,128

TABLE A-10. Reported total fishing effort for all species (E; 1000 hooks), and catch (C; metric tons) of yellowfin, skipjack, bigeye, Pacific bluefin, and albacore tunas only, by flag, by the longline fishing fleets operating in the EPO.

TABLA A-10. Esfuerzo de pesca total reportado (E; 1000 anzuelos) para todas las especies, y captura (C; toneladas métricas) de aleta amarilla, barrilete, patudo, aleta azul del Pacífico, y albacora solamente, por bandera, de las flotas palangreras que faenan en el OPO.

LL	CHN		JPN		KOR		MEX		PAN		PYF		TWN		USA		VUT	
	E	C	E	C	E	C	E	C	E	C	E	C	E	C	E	C	E	C
1976			117,301	68,895	3,931	2,043							2,364	1,633				
1977			132,875	83,725	10,958	5,628							11,973	7,789				
1978			140,006	79,320	8,571	7,012							8,743	6,525				
1979			137,769	67,932	5,021	2,305							3,138	2,293				
1980			138,141	75,639	11,788	5,907							3,000	1,611				
1981			131,275	59,226	19,731	6,539							5,952	2,949				
1982			116,200	61,370	18,612	7,488							8,117	3,910				
1983			127,176	69,563	14,675	6,479	1	49					4,850	2,311				
1984			119,635	57,261	11,767	4,491							3,730	1,734				
1985			106,758	74,348	19,785	10,508	0	2					3,126	1,979				
1986			160,553	111,672	30,765	17,432	3	68					4,874	2,569				
1987			188,393	104,053	36,436	19,405	5	273					12,267	5,335				
1988			182,694	82,383	43,056	10,172	4	234					9,567	4,590				
1989			170,373	84,961	43,365	4,879	0	9					16,360	4,962				
1990			178,419	117,923	47,167	17,415							12,543	4,755				
1991			200,365	112,337	65,024	24,644							17,969	5,862	43	12		
1992			191,284	93,011	45,634	13,104					500	89	33,025	14,142	325	106		
1993			159,955	87,977	46,375	12,843	3	2			2,605	79	18,064	6,566	417	81		
1994			163,976	92,606	44,788	13,250	14	41			3,410	574	12,588	4,883	302	25		
1995			129,598	69,435	54,979	12,778	27	7			3,452	559	2,910	1,639	823	180		
1996			103,653	52,298	40,290	14,121	3	0			4,219	931	5,830	3,553	507	182		
1997			96,383	59,325	30,493	16,663					5,490	1,941	8,720	5,673	462	215		
1998			106,569	50,167	51,817	15,089	12	16			6,415	2,858	10,586	5,039	1,020	406		
1999			80,958	32,886	54,269	13,294	48	74			9,190	4,446	23,247	7,865	1,680	450		
2000			79,311	45,216	33,585	18,759	192	237	54	378	10,230	4,382	18,152	7,809	1,076	132	34	3,080
2001	13,056	7,362	102,219	54,775	72,261	18,201	196	30	138	866	11,200	5,086	53,224	20,060	1,400	209	26	3,583
2002	36,756	10,398	104,193	45,527	96,273	14,370	151	5	153	816	10,700	3,238	77,051	31,773	236	26	45	4,187
2003	43,289	14,548	103,713	36,861	71,006	15,551	179	407	10	*	14,048	4,101	74,322	28,328	1,314	254	85	6,090
2004	15,889	4,034	68,988	27,255	*	10,729	55	46	*	*	17,865	3,030	*	19,535	1,040	174	21	1,564
2005	*	972	*	14,398	*	9,590	2	1	*	*	*	*	*	6,129	*	158	*	740

¹ Less than 100% of the total catch and effort (KOR 1975-1986 only)—Menos del 100% de la captura y esfuerzo totales (KOR 1975-1986 solamente)

TABLE A-11. Numbers and well volumes, in cubic meters, of purse-seine and pole-and line vessels of the EPO tuna fleet, 1975-2005. The data for 2005 are preliminary.

TABLA A-11. Número y volumen de bodega, en metros cúbicos, de buques cerqueros y cañeros de la flota atunera del OPO, 1975-2005. Los datos de 2005 son preliminares.

	PS		LP		Total	
	No.	Vol. (m ³)	No.	Vol. (m ³)	No.	Vol. (m ³)
1975	253	174,016	111	8,055	364	182,072
1976	254	187,512	137	8,471	391	195,983
1977	253	189,967	116	6,780	369	196,746
1978	271	192,259	118	6,736	389	198,995
1979	282	195,494	50	4,341	332	199,835
1980	270	196,476	50	4,186	320	200,662
1981	251	196,484	41	3,308	292	199,792
1982	223	178,234	40	3,016	263	181,250
1983	215	149,404	60	3,940	275	153,344
1984	175	121,650	40	3,245	215	124,895
1985	178	137,814	25	2,574	203	140,387
1986	166	131,806	17	2,060	183	133,867
1987	177	152,351	29	2,376	206	154,727
1988	189	156,636	36	3,274	225	159,910
1989	178	141,956	30	3,135	208	145,091
1990	172	143,946	23	2,044	195	145,990
1991	155	124,501	19	1,629	174	126,131
1992	160	117,017	19	1,612	179	118,629
1993	152	118,730	15	1,543	167	120,272
1994	167	122,214	20	1,725	187	123,939
1995	175	124,096	20	1,784	195	125,880
1996	183	132,731	17	1,639	200	134,370
1997	194	146,533	23	2,105	217	148,637
1998	203	161,560	22	2,217	225	163,777
1999	208	180,652	14	1,656	222	182,308
2000	205	180,625	13	1,311	218	181,936
2001	205	189,966	10	1,259	215	191,225
2002	218	200,075	6	925	224	201,000
2003	215	202,674	3	338	218	203,012
2004	217	206,302	3	338	220	206,640
2005	219	212,923	4	498	223	213,421

TABLE A-12a. Estimates of the numbers and well volume (cubic meters) of purse-seine (PS) and pole-and-line (LP) vessels that fished in the EPO in 2004 by flag, gear, and size class. Each vessel is included in the total for each flag under which it fished during the year, but is included only once in the "Grand total"; therefore the grand total may not equal the sums of the individual flags.

TABLA A-12a. Estimaciones del número y volumen de bodega (metros cúbicos) de buques cerqueros (PS) y cañeros (LP) que pescaron en el OPO en 2004, por bandera, arte de pesca, y clase de arqueo. Se incluye cada buque en los totales de cada bandera bajo la cual pescó durante el año, pero solamente una vez en el "Total general"; por consiguiente, los totales generales no equivalen necesariamente a las sumas de las banderas individuales.

Flag Bandera	Gear Arte	Size class—Clase de arqueo						Total	Well volume Volumen de bodega m ³
		1	2	3	4	5	6		
Number—Número									
BOL	PS	-	-	2	1	-	5	8	6,412
COL	PS	-	-	-	1	1	9	11	11,466
ECU	PS	-	5	11	13	10	40	79	51,642
ESP	PS	-	-	-	-	-	4	4	8,859
GTM	PS	-	-	-	-	-	2	2	3,415
HND	PS	-	-	-	-	-	3	3	2,810
MEX	PS	-	-	2	7	11	39	59	52,443
	LP	-	1	2	-	-	-	3	338
NIC	PS	-	-	-	-	-	3	3	3,926
PAN	PS	-	-	-	2	1	18	21	25,531
SLV	PS	-	-	-	-	-	3	3	5,377
USA	PS	-	-	1	-	-	6	7	8,178
VEN	PS	-	-	-	-	-	23	23	29,961
VUT	PS	-	-	-	-	-	4	4	5,082
UNK	PS	-	-	1	-	-	-	1	180
Grand total— Total general	PS	-	5	14	24	22	152	217	
	LP	-	1	2	-	-	-	3	
	PS + LP	-	6	16	24	22	152	220	
Well volume—Volumen de bodega (m³)									
Grand total— Total general	PS	-	489	2,462	6,712	9,727	186,912	206,302	
	LP	-	101	237	-	-	-	338	
	PS + LP	-	590	2,699	6,712	9,727	186,912	206,640	

- : none—ninguno

TABLE A-12b. Estimates of the numbers and well volume (cubic meters) of purse-seine (PS) and pole-and-line (LP) vessels that fished in the EPO in 2005 by flag, gear, and size class. Each vessel is included in the total for each flag under which it fished during the year, but is included only once in the "Grand total"; therefore the grand total may not equal the sums of the individual flags.

TABLA A-12b. Estimaciones del número y volumen de bodega (metros cúbicos) de buques cerqueros (PS) y cañeros (LP) que pescaron en el OPO en 2005, por bandera, arte de pesca, y clase de arqueo. Se incluye cada buque en los totales de cada bandera bajo la cual pescó durante el año, pero solamente una vez en el "Total general"; por consiguiente, los totales generales no equivalen necesariamente a las sumas de las banderas individuales.

Flag Bandera	Gear Arte	Size class—Clase de arqueo						Total	Well Volume Volumen de bodega m ³
		1	2	3	4	5	6		
Number—Número									
COL	PS	-	-	-	1	1	11	13	14,439
ECU	PS	-	4	11	13	10	42	80	54,993
ESP	PS	-	-	-	-	-	3	3	6,955
GTM	PS	-	-	-	-	-	1	1	1,475
HND	PS	-	-	-	-	-	3	3	2,810
MEX	PS	-	-	2	5	11	41	59	56,163
	LP	-	1	3	-	-	-	4	498
NIC	PS	-	-	-	-	-	6	6	8,060
PAN	PS	-	-	-	2	1	22	25	32,320
SLV	PS	-	-	-	-	-	4	4	6,324
USA	PS	-	-	1	-	-	1	2	1,365
VEN	PS	-	-	-	-	-	26	26	33,839
VUT	PS	-	-	-	-	-	2	2	2,163
UNK	PS	-	-	-	1	-	-	1	222
Grand total— Total general	PS	-	4	14	22	23	156	219	
	LP	-	1	3	-	-	-	4	
	PS + LP	-	5	17	22	23	156	223	
Well volume—Volumen de bodega (m³)									
Grand total— Total general	PS	-	407	2,616	6,356	10,440	193,104	212,923	
	LP	-	101	397	-	-	-	498	
	PS + LP	-	508	3,013	6,356	10,440	193,104	213,421	

- : none—ninguno

TABLE A-13. Minimum, maximum, and average capacity, in thousands of metric tons, of purse-seine and pole-and-line vessels at sea in the EPO during 1995-2004 and in 2005, by month.

TABLA A-13. Capacidad mínima, máxima, y media, en miles de toneladas métricas, de los buques cerqueros y cañeros en el mar en el OPO durante 1995-2004 y en 2005, por mes.

Month Mes	1995-2004			2005
	Min	Max	Ave-Prom	
1	67.0	121.6	96.8	144.3
2	67.9	144.1	106.3	150.8
3	70.3	149.8	104.0	141.0
4	64.2	143.0	107.1	142.8
5	65.3	135.4	103.0	147.9
6	74.1	144.7	105.0	162.9
7	70.8	153.5	108.6	155.5
8	66.7	140.2	105.7	62.2
9	64.2	137.7	104.9	108.1
10	72.3	145.6	109.3	172.2
11	60.0	145.0	103.4	137.3
12	33.1	116.4	71.3	105.8
Ave-Prom	64.7	139.8	102.1	135.9

B. ATÚN ALETA AMARILLA

Se usó un análisis de la captura por talla y edad, A-SCALA (del inglés *age-structured, catch-at-length analysis*) para evaluar el atún aleta amarilla en el Océano Pacífico oriental (OPO). Se describe el método analítico en el Boletín de la CIAT, Vol. 22, No. 5, y se refiere a los lectores a los detalles técnicos en dicho informe. Para mayor detalle de la evaluación más reciente, ver el Informe de Evaluación de Stocks 6, disponible en la [página web de la CIAT](#).

La evaluación presentada en este informe se basa en el supuesto que existe una sola población de atún aleta amarilla en el OPO. El aleta amarilla se encuentra distribuido por todo el Océano Pacífico, pero la mayor parte de la captura proviene de las zonas oriental y occidental del mismo. Las capturas cerqueras de aleta amarilla son menores cerca del límite occidental del OPO (Figura A-1). Los desplazamientos de aletas amarillas marcados suelen ser de centenas, no miles, de kilómetros, y el intercambio entre el OPO y el Pacífico occidental parece ser limitado. Esto es consistente con las tendencias de la CPUE palangrera, que varían entre áreas. Es probable que exista una población continua en el Océano Pacífico entero, con intercambio de individuos a nivel local, aunque existe cierta evidencia genética de aislamiento local. No fue posible estimar las tasas de desplazamiento entre el OPO y el Pacífico occidental con los datos de marcado actualmente disponibles.

La evaluación de poblaciones requiere cantidades sustanciales de información, incluyendo datos de capturas retenidas, descartes, esfuerzo de pesca, y composición por tamaño de las capturas de las distintas pesquerías. Se hicieron supuestos sobre procesos tales como crecimiento, reclutamiento, desplazamiento, mortalidad natural, mortalidad por pesca, y estructura de poblaciones. Varios insumos de esta última evaluación son diferentes de aquéllos de 2004. Fueron incorporados datos recientes de esfuerzo y captura (2005 en el caso de la pesca de cerco y 2004 en el caso de la mayoría de las capturas palangreras). Los datos anteriores fueron actualizados. En la Figura B-1 se presentan los datos de captura.

Se han observado niveles significativos de mortalidad por pesca en la pesquería de aleta amarilla en el OPO (Figura B-2). Fueron máximos para peces de edad mediana. Tanto el reclutamiento (Figura B-3) como la explotación han ejercido impactos sustanciales sobre la trayectoria de la biomasa de la especie (Figura B-4). La mayoría de la captura de aleta amarilla proviene de lances sobre cardúmenes asociados con delfines, y por lo tanto este método ha ejercido el mayor impacto sobre la población de aleta amarilla (Figura B-4), aunque su impacto por unidad de peso capturado es casi el más bajo de todos los métodos de pesca. Parece que la población de aleta amarilla ha experimentado dos regímenes de productividad distintos (1975-1983 y 1984-2004) con reclutamiento mayor en el segundo. Estos dos regímenes (Figura B-3) corresponden a dos regímenes en biomasa (Figura B-4), el régimen con reclutamiento mayor corresponde a biomasa mayor. El cociente de biomasa reproductora (el cociente de la biomasa reproductora actual a la de la población no explotada, denominado SBR (*spawning biomass ratio*)) de aleta amarilla en el OPO estuvo por debajo del nivel que permitiría los rendimientos máximos sostenibles promedio (RMSP) durante el régimen de reclutamiento bajo, pero cerca de dicho nivel durante el régimen de reclutamiento alto (Figura B-5). Es posible que los dos regímenes de productividad soporten dos niveles distintos de RMSP y de SBR asociados, y el RMSP aquí reportado es el promedio del período de 1975-2005.

El SBR actual es superior al nivel de SBR correspondiente al RMSP (Figura B-5). Sin embargo, hay una incertidumbre sustancial en la estimación más reciente de SBR, y existe una probabilidad moderada de que el SBR actual esté por encima del nivel correspondiente al RMSP. Se estima que los niveles de esfuerzo están por debajo de aquéllos correspondientes al RMSP (Tabla B-1, a partir de la distribución reciente (2003-2004) del esfuerzo entre las varias pesquerías). Proyecciones a futuro con los niveles actuales de esfuerzo y reclutamiento medio señalan que la población permanecerá probablemente en aproximadamente el mismo nivel durante los próximos cinco años (Figura B-6). Se realizaron estas simulaciones usando el reclutamiento medio del período de 1975-2005. Se espera que las capturas, tanto cerqueras como palangreras, continúen, en promedio, cerca de los niveles de 2004 (Figura B-6).

El RMSP ha sido estable durante el período de la evaluación (Figura B-7), lo cual sugiere que el patrón

general de selectividad no ha variado mucho con el tiempo.

El análisis indica que cohortes fuertes ingresaron a la pesquería durante 1998-2000 y que incrementaron el tamaño de la población reproductora durante 1999-2001, pero ya pasaron por la población, y el tamaño de la población reproductora disminuyó durante 2002-2005.

El peso medio de los aletas amarillas en la captura ha sido siempre muy inferior a aquél que incrementaría el RMSP al máximo, indicando que, desde el punto de vista de rendimiento por recluta, el aleta amarilla en el OPO no es pescado al tamaño óptimo. Hay una variabilidad sustancial en el peso promedio del aleta amarilla capturado por las distintas pesquerías. En general, las pesquerías sobre objetos flotantes, no asociadas, y cañera capturan peces más jóvenes y pequeños que las pesquerías asociadas con delfines y palangreras. En las pesquerías palangreras y en los lances sobre delfines en la zona Sur se capturan aletas amarillas de mayor edad y tamaño que en las pesquerías sobre delfines Costera y Norte. Los cálculos de RMSP indican que se podrían incrementar los niveles de rendimiento si se desviara el esfuerzo de pesca hacia las pesquerías que capturan aleta amarilla de mayor tamaño, y que disminuirían si el esfuerzo de pesca fuera dirigido hacia la captura de peces pequeños. Cualquier cambio de este tipo afectaría también los niveles de SBR de forma similar.

Se predice que las medidas de conservación impuestas en 2004 de conformidad con la [Resolución C-04-09](#) de la CIAT mantendrán a la población en aproximadamente el nivel de RMSP, ligeramente mayor de lo que hubiese sido sin las medidas. .

Las capturas durante el primer trimestre de 2006 han sido marcadamente menores que aquéllas de los períodos correspondientes de 2004 y 2005. Las estimaciones del tamaño de la población en 2005 y 2006 son similares en el caso base y el análisis de sensibilidad con una relación población-reclutamiento. La causa más probable de la disminución de las capturas es una reducción de la capturabilidad.

Se realizó un análisis de sensibilidad para estimar el efecto de una relación población-reclutamiento y tallas máximas medias alternativas del aleta amarilla. Los resultados sugieren que el modelo con una relación población-reclutamiento se ajusta a los datos ligeramente mejor que el caso base, pero este resultado podría también ser explicado por el cambio de régimen, ya que la biomasa reproductora es baja durante el período de reclutamiento bajo y alto durante el reclutamiento alto. Los resultados del análisis con una relación población-reclutamiento sugieren que el nivel de esfuerzo está por encima del nivel correspondiente al RMSP (Tabla B-1). Se estima que la población reproductora fue menor que la biomasa que permitiría el RMSP durante la mayor parte del período del modelo, excepto durante 2000-2003.

RESUMEN

1. Se estima que la biomasa disminuyó muy ligeramente en 2005.
2. Existe incertidumbre acerca de los niveles recientes y futuros de reclutamiento y biomasa.
3. El SBR actual es mayor que aquél que permitiría el RMSP, pero su intervalo de confianza abarca el RMSP.
4. Las tasas recientes de mortalidad por pesca son un 20% mayores que aquéllas correspondientes al RMSP.
5. Un aumento del peso medio del aleta amarilla capturado podría incrementar el RMSP sustancialmente.
6. Hubo dos regímenes distintos de productividad, y los niveles de RMSP y la biomasa correspondiente al RMSP podrían ser diferentes para los dos regímenes.
7. Los resultados son más pesimistas si se supone una relación población-reclutamiento.




FIGURE B-1. Total catches (retained catches plus discards) for the purse-seine fisheries, and retained catches for the pole-and-line fishery and longline fisheries, of yellowfin tuna in the eastern Pacific Ocean, 1975-2005. The purse-seine catches for 1975-1992 are based on unloading data, adjusted to the species composition estimate. The data for the longline catches for 1975-2004 are those reported to the IATTC by governments.

FIGURA B-1. Capturas totales (capturas retenidas más descartes) de las pesquerías de cerco, y capturas retenidas de las pesquerías cañera y palangreras, de atún aleta amarilla en el Océano Pacífico oriental, 1975-2005. Las capturas cerqueras de 1975-1992 se basan en datos de descargas, ajustados a la estimación de la composición por especie. Los datos de las capturas palangreras de 1975-2004 son las que reportaron los gobiernos a la CIAT.




FIGURE B-2. Time series of average total annual fishing mortality of yellowfin tuna that have been recruited to the fisheries of the EPO. Each panel illustrates an average of four annual fishing mortality vectors that affected the fish of the age range indicated in the title of each panel. For example, the trend illustrated in the upper-left panel is an average of the fishing mortalities that affected fish that were 2-5 quarters old.

FIGURA B-2. Series de tiempo de la mortalidad por pesca trimestral total media de atún aleta amarilla reclutado a las pesquerías del OPO. Cada recuadro ilustra un promedio de cuatro vectores trimestrales de mortalidad por pesca que afectaron los peces de la edad indicada en el título de cada recuadro. Por ejemplo, la tendencia ilustrada en el recuadro superior izquierdo es un promedio de las mortalidades por pesca que afectaron a los peces de entre 2 y 5 trimestres de edad.




FIGURE B-3. Estimated recruitment of yellowfin tuna to the fisheries of the EPO. The estimates are scaled so that the average recruitment is equal to 1.0. The bold line illustrates the maximum likelihood estimates of recruitment, and the shaded area indicates the approximate 95% confidence intervals around those estimates.

FIGURA B-3. Reclutamiento estimado de atún aleta amarilla a las pesquerías del OPO. Se escalan las estimaciones para que el reclutamiento medio equivalga a 1,0. La línea gruesa ilustra las estimaciones de probabilidad máxima del reclutamiento, y el área sombreada indica los intervalos de confianza de 95% aproximados de esas estimaciones.




FIGURE B-4. Biomass trajectory of a simulated population of yellowfin tuna that was not exploited during 1975-2004 (dashed line) and that predicted by the stock assessment model (solid line). The shaded areas between the two lines represent the portion of the fishery impact attributed to each fishing method.

FIGURA B-4. Trayectoria de la biomasa de una población simulada de atún aleta amarilla no explotada durante 1975-2004 (línea de trazos) y la que predice el modelo de evaluación (línea sólida). Las áreas sombreadas entre las dos líneas representan la porción del impacto de la pesca atribuida a cada método de pesca.




FIGURE B-5. Spawning biomass ratios (SBRs) for 1975-2005 and SBRs projected during 2006-2011 for yellowfin tuna in the EPO. The dashed horizontal line (at 0.37) identifies SBR_{AMS} . The shaded area represents the 95% confidence limits of the estimates. The estimates after 2006 (the large dot) indicate the SBR predicted to occur if effort continues at the average of that observed in 2005, catchability (with effort deviates) continues at the average for 2003 and 2004, and average environmental conditions occur during the next 5 years.

FIGURA B-5. Cocientes de biomasa reproductora (SBR) para 1975-2005 y SBR proyectados durante 2006-2011 para el atún aleta amarilla en el OPO. La línea de trazos horizontal (en 0.37) identifica SBR_{RPM} . El área sombreada representa los límites de confianza de 95% de las estimaciones. Las estimaciones a partir de 2006 (el punto grande) señalan el SBR predicho si el esfuerzo continúa en el nivel promedio observado en 2005, la capturabilidad (con desvíos de esfuerzo) continúa en el promedio de 2003 y 2004, y ocurren condiciones ambientales medias en los 5 próximos años.




FIGURE B-6. Catches of yellowfin tuna during 1975-2005 and simulated catches of yellowfin tuna during 2006-2010 taken by the purse-seine and pole-and-line fleets (upper panel) and the longline fleet (lower panel). The shaded area represents the 95% confidence limits of the estimates.

FIGURA B-6. Capturas de atún aleta amarilla durante 1975-2005 y capturas simuladas de aleta amarilla durante 2006-2010 por las flotas de cerco y de caña (recuadro superior) y la flota palangrera (recuadro inferior). El área sombreada representa los intervalos de confianza de 95% estimados de las estimaciones.




FIGURE B-7. AMSY (upper panel), 1975-2005, and the change (increase or reduction) in the effort corresponding to the AMSY (lower panel), estimated separately for each year, using the average age-specific fishing mortality for that year.

FIGURA B-7. RMSP (recuadro superior), 1975-2005, y cambio (aumento o reducción) del esfuerzo correspondiente al RMSP (recuadro inferior), estimado por separado para cada año, usando la mortalidad por pesca promedio por edad de ese año.

TABLE B-1. AMSY and related quantities for the base case, the stock-recruitment relationship sensitivity analysis, and growth sensitivity analyses. All analyses are based on average fishing mortality for 2003 and 2004. B_{recent} and B_{AMSY} are the biomass of yellowfin tuna 2+ quarters old at the start of 2006 and at AMSY, respectively, and S_{recent} and S_{AMSY} are indices of spawning biomass (therefore, they are not in metric tons). C_{recent} is the estimated total catch in 2005.

TABLA B-1. El RMSP y sus valores asociados para la evaluación del caso base y el análisis de sensibilidad que incluye una relación población-reclutamiento, y análisis de sensibilidad al crecimiento. Todos los análisis se basan en la mortalidad por pesca media de 2003 y 2004. B_{reciente} y B_{RMSP} son la biomasa de peces de 2+ trimestres de edad al principio de 2006 y en RMSP, respectivamente, y S_{reciente} y S_{RMSP} son índices de la biomasa reproductora (por tanto, no se expresan en toneladas). C_{reciente} es la captura total estimada en 2005.

	Base case Caso base	h = 0.75	L_{inf.}170	L_{inf.}200
AMSY–RMSP	287,519	300,282	288,809	287,695
$B_{\text{AMSY}} - B_{\text{rm2}}$	416,379	546,213	409,895	419,322
$S_{\text{AMSY}} - S_{\text{rm2}}$	4,677	6,444	4,662	4,661
$C_{\text{recent}}/\text{AMSY} - C_{\text{reciente}}/\text{RMSP}$	1.06	1.01	1.05	1.06
$B_{\text{recent}}/B_{\text{AMSY}} - B_{\text{reciente}}/B_{\text{RMSP}}$	1.00	0.77	1.02	1.02
$S_{\text{recent}}/S_{\text{AMSY}} - S_{\text{reciente}}/S_{\text{RMSP}}$	1.14	0.83	1.16	1.15
$S_{\text{AMSY}}/S_{F=0} - S_{\text{RMSP}}/S_{F=0}$	0.37	0.43	0.36	0.37
<i>F multiplier—Multiplicador de F</i>	1.02	0.68	1.04	1.04

C. ATÚN BARRILETE

Se usa un análisis de la captura por talla y edad, A-SCALA (del inglés *age-structured, catch-at-length analysis*) para evaluar el atún barrilete en el Océano Pacífico oriental (OPO). Se describe el método analítico en el Boletín de la CIAT, Vol. 22, No. 5, y se refiere a los lectores a los detalles técnicos en dicho informe. Se usó este método para la evaluación más reciente del barrilete, realizada en 2004 (Informe de Evaluación de Stocks 5, disponible en la [página web de la CIAT](#)), la que incluyó datos de 2003.

La evaluación de poblaciones requiere cantidades sustanciales de información, incluyendo datos de capturas retenidas, descartes, esfuerzo de pesca, y composición por tamaño de las capturas de las distintas pesquerías. En la Figura C-1 se ilustran las capturas usadas en la evaluación. Se hicieron también varios supuestos sobre procesos tales como crecimiento, reclutamiento, desplazamiento, mortalidad natural, mortalidad por pesca, y estructura de poblaciones. La evaluación es considerada preliminar porque (1) no se sabe si la captura por día de pesca de las pesquerías de cerco es proporcional a la abundancia del barrilete, (2) es posible que exista una población de barrilete grande que es invulnerable a las pesquerías, y (3) la estructura de la población con respecto a los peces en el OPO y en el Océano Pacífico occidental y central es incierta. Sin embargo, los resultados de los análisis de sensibilidad para la presente evaluación son más consistentes con aquéllos de años anteriores.

El reclutamiento del atún barrilete a las pesquerías en el OPO es altamente variable, y se ha estimado un reclutamiento mayor al promedio para el período después de la introducción de los plantados a principios de los años 1990, asociada con una expansión de la pesquería hacia el sur (Figura C-2). Se estima que la mortalidad por pesca (Figura C-3) es aproximadamente igual, o mayor, que la tasa de mortalidad natural. Estas estimaciones de la mortalidad por pesca son respaldadas por estimaciones de datos de marcado. La biomasa fluctúa en reacción a variaciones en el reclutamiento la explotación (Figura C-4). Las estimaciones de biomasa absoluta son moderadamente sensibles a la ponderación asignada a la información sobre abundancia en los datos de captura y esfuerzo de las pesquerías sobre objetos flotantes y el supuesto de selectividad monotónica, pero las tendencias en la biomasa no lo son.

El análisis indica que un grupo de cohortes relativamente fuertes (pero no tan fuertes como las de 1998) ingresó a la pesquería en 2002-2003, y esas cohortes incrementaron la biomasa y las capturas durante 2003. Existe una indicación de que los reclutamientos más recientes fueron medios, lo cual podría llevar a biomasa y capturas más bajas, pero estas estimaciones de reclutamiento bajo se basan en información limitada, y son por lo tanto inciertas.

Hay una variación considerable en el cociente de la biomasa reproductora a la biomasa reproductora de la población no explotada (*spawning biomass ratio*, SBR) del atún barrilete en el OPO (Figura C-5). En 2003 el SBR estuvo en un nivel alto (aproximadamente 0.61). Las estimaciones basadas en el rendimiento máximo sostenible promedio (RMSP) y el rendimiento por recluta señalan que se logra el rendimiento máximo con una mortalidad por pesca infinita porque el peso crítico es menor que el peso medio de reclutamiento a la pesquería. Sin embargo, esto no es seguro debido a incertidumbres en las estimaciones de mortalidad natural y crecimiento. Las estimaciones de SBR no son sensibles a la ponderación asignada a la información sobre abundancia en los datos de captura y esfuerzo de las pesquerías sobre objetos flotantes y el supuesto de selectividad monotónica.

Los resultados de un nuevo análisis en 2006, en el cual se elaboró un índice de abundancia relativa a partir de las proporciones de los atunes barrilete y patudo en la pesca sobre objetos flotantes, fueron consistentes con las evaluaciones previas, y sugieren que no existe motivo de preocupación con respecto a la ordenación del atún barrilete, aparte de la captura asociada de patudo en los lances sobre objetos flotantes.




FIGURE C-1. Total catches (retained catches plus discards) of skipjack tuna by the purse-seine fisheries on floating objects and unassociated schools, and by other fisheries combined, in the eastern Pacific Ocean, 1975-2005. The purse-seine catches for 1975-1992 are based on unloading data, adjusted to the species composition estimate.

FIGURA C-1. Capturas totales (capturas retenidas más descartes) de atún barrilete por las pesquerías de cerco sobre objetos flotantes y cardúmenes no asociados, y de las demás pesquerías combinadas, en el Océano Pacífico oriental, 1975-2005. Las capturas cerqueras de 1975-1992 se basan en datos de descargas, ajustados a la estimación de la composición por especie.




FIGURE C-2. Estimated recruitment of skipjack tuna to the fisheries of the EPO. The estimates are scaled so that the average recruitment is equal to 1.0. The solid line illustrates the maximum-likelihood estimates of recruitment, and the shaded area the 95% confidence intervals. The labels on the time axis are drawn at the start of each year, but, since the assessment model represents time on a monthly basis, there are 12 estimates of recruitment for each year.

FIGURA C-2. Reclutamiento estimado de atún barrilete a las pesquerías del OPO. Se escalan las estimaciones para que el reclutamiento medio equivalga a 1,0. La línea sólida ilustra las estimaciones de reclutamiento de probabilidad máxima, y el área sombreada los intervalos de confianza de 95%. Se dibujan las leyendas en el eje de tiempo al principio de cada año, pero, ya que el modelo de evaluación representa el tiempo por meses, hay 12 estimaciones de reclutamiento para cada año.




FIGURE C-3. Time series of average total monthly fishing mortality of skipjack tuna recruited to the fisheries of the EPO. Each panel illustrates an average of 12 monthly fishing mortality vectors that affected fish of the age range indicated in the title of each panel. For example, the trend illustrated in the left panel is an average of the fishing mortalities that affected fish that were 9-20 months old.

FIGURA C-3. Series de tiempo de la mortalidad por pesca mensual total media de atún barrilete reclutado a las pesquerías del OPO. Cada recuadro ilustra un promedio de 12 vectores mensuales de mortalidad por pesca que afectaron los peces de la edad indicada en el título de cada recuadro. Por ejemplo, la tendencia ilustrada en el recuadro izquierdo es un promedio de las mortalidades por pesca que afectaron a los peces de entre 9 y 20 meses de edad.




FIGURE C-4. Biomass trajectory of a simulated population of skipjack tuna that was not exploited during 1975-2004 (dashed line) and that predicted by the stock assessment model (solid line). The shaded areas between the two lines represent the portion of the fishery impact attributed to each fishing method.

FIGURA C-4. Trayectoria de la biomasa de una población simulada de atún barrilete no explotada durante 1975-2004 (línea de trazos) y la que predice el modelo de evaluación (línea sólida). Las áreas sombreadas entre las dos líneas representan la porción del impacto de la pesca atribuida a cada método de pesca.




FIGURE C-5. Estimated time series of spawning biomass ratios (SBRs) for skipjack tuna in the EPO, from the monotonic selectivity assessment. The shaded area represents the 95% confidence limits of the estimates.

FIGURA C-5. Series de tiempo estimadas de los cocientes de biomasa reproductora (SBR) de atún barrilete en el OPO, de la evaluación de selectividad monotónica. El área sombreada representa los intervalos de confianza de 95% de las estimaciones.

D. ATÚN PATUDO

Han ocurrido cambios sustanciales en la pesquería de atún patudo en los últimos años (Figura D-1). Al principio, la mayor parte de la captura de patudo fue lograda por buques palangreros. Con la expansión de la pesca sobre dispositivos agregadotes de peces (plantados) desde 1993, la pesquería de cerco ha tomado una proporción creciente de la captura de la especie. Esta pesquería captura patudo de menor tamaño, y por lo tanto ha reducido el rendimiento por recluta y el rendimiento máximo sostenible promedio (RMSP). En promedio, la mortalidad por pesca de patudo de menos de unos cuatro años y medio de edad ha aumentado sustancialmente desde 1993, y la de los peces mayores ha aumentado ligeramente (Figura D-3).

Se usa un análisis de la captura por talla y edad, A-SCALA (del inglés *age-structured, catch-at-length analysis*) para evaluar el atún patudo en el Océano Pacífico oriental (OPO). Se describe el método analítico en el Boletín de la CIAT, Vol. 22, No. 5, y se refiere a los lectores a los detalles técnicos en dicho informe. Para mayor detalle de la evaluación más reciente, ver el Informe de Evaluación de Stocks 6, disponible en la [página web de la CIAT](#).

El patudo se encuentra distribuido por todo el Océano Pacífico, pero la mayor parte de la captura proviene de las zonas oriental y occidental del mismo. Las capturas cerqueras de patudo son sustancialmente menores alrededor del límite occidental del OPO (Figura A-3); las capturas palangreras son más continuas, pero muestran niveles más bajos entre 160°O y 180° (Figura A-4). El patudo no se desplaza grandes distancias – en estudios recientes, el 95% de los especímenes marcados recapturados fueron capturados a menos de 1000 millas de su punto de liberación – y la información actual, aunque insuficiente, indica poco intercambio entre el Pacífico oriental y occidental (Figura D-2). Esto es consistente con las diferencias de las tendencias de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) palangrera entre zonas. Es probable que exista una población continua en el Océano Pacífico entero, con intercambio de individuos a nivel local. La evaluación aquí descrita fue realizada como si hubiese una sola población en el OPO. Los resultados son consistentes con los resultados de otros análisis del atún patudo en el Pacífico entero. Además, los análisis han demostrado que los resultados no son sensibles a la estructura espacial del análisis.

Varios insumos de la presente evaluación son diferentes de aquéllos de 2004. Fueron incorporados datos recientes de captura y esfuerzo, y los datos anteriores fueron actualizados.

La serie de tiempo de estimaciones del reclutamiento de patudo tiene varias características importantes (Figura D-4). En primer lugar, las estimaciones del reclutamiento antes de 1993 son inciertas, ya que las pesquerías sobre objetos flotantes, que capturan patudo pequeño, no estaban en operación. En segundo lugar, hubo un período de reclutamiento superior al promedio en 1995-1998, seguido por un período de reclutamiento inferior al promedio en 1999-2000. Los reclutamientos fueron superiores al promedio en 2001 y 2002. En tercer lugar, la estimación del reclutamiento más reciente es incierta, debido a que el patudo reclutado recientemente se encuentra representado en solamente unos pocos muestras de frecuencia de talla. El período extendido de reclutamientos relativamente altos durante 1994-1998 coincidió con la expansión de las pesquerías que capturan patudo en asociación con objetos flotantes.

La biomasa de patudo en el OPO ha estado disminuyendo desde 1987, debido inicialmente al impacto de la pesca palangrera y desde 1993, a la pesca de cerco, cuyo impacto es ahora mayor. La disminución fue interrumpida por un reclutamiento fuerte durante 1995-1998, que produjo una biomasa pico en 2000, y (con menos certeza) un reclutamiento bueno durante 2004 y 2005.

Al principio de 2006, la biomasa reproductora de atún patudo en el OPO (Figura D-6, punto grande) se estaba recuperando del nivel más bajo observado previamente. En ese momento se estimó que el cociente de biomasa reproductora (el cociente de la biomasa reproductora actual a la de la población no explotada, denominado SBR (*spawning biomass ratio*)) era ligeramente inferior al nivel correspondiente al rendimiento máximo sostenible promedio (SBR_{RMSP}), con un límite de confianza (± 2 desviaciones estándar) que se solapa con el SBR_{RMSP} .

Estimaciones del SBR medio que se proyecta ocurrirá durante 2006-2011 indican que es probable que el SBR se incremente al nivel correspondiente al RMSP y que posteriormente siga disminuyendo, a menos que se reduzca mucho la mortalidad por pesca (Figura D-7).

El peso promedio del pescado en la captura de todas las pesquerías combinadas disminuyó sustancialmente en 1993 y 1994, y ha permanecido en ese nivel bajo desde entonces. El patrón reciente de mortalidad por pesca por edad no es satisfactorio del punto de vista de rendimiento por recluta.

En la evaluación del caso base se estima que las capturas recientes estuvieron alrededor del RMSP (Tabla D-1). Si la mortalidad por pesca es proporcional al esfuerzo de pesca, y se mantienen los patrones actuales de selectividad por edad, el nivel de esfuerzo de pesca correspondiente al RMSP es un 69% del nivel de esfuerzo reciente (2003-2004). Reducir el esfuerzo al 69% de su nivel actual incrementaría el rendimiento medio a largo plazo un 5%, pero aumentaría el potencial de reproducción de la población un 75%. Se podría incrementar al máximo el RMSP de patudo en el OPO si el patrón de selectividad por edad fuese similar a aquél de la pesquería palangrera que faena al sur de 15°N porque captura peces mayores. Antes de la expansión de la pesquería sobre objetos flotantes que empezó en 1993, el RMSP fue mayor que el RMSP actual, y la mortalidad por pesca fue menor que la que corresponde al RMSP (Figura D-8).

Se realizaron varios análisis de sensibilidad que investigaron la incorporación de una relación población-reclutamiento en la evaluación y un cambio de la talla máxima del patudo.

Todos los análisis considerados, menos uno con una talla máxima baja, sugirieron que, al principio de 2005, la biomasa reproductora estuvo por debajo del nivel correspondiente al RMSP (Tabla D-1). El RMSP y el multiplicador de mortalidad por pesca (F) son sensibles a la parametrización del modelo, a los datos que se incluyen en la evaluación, y a los períodos que se supone representan la mortalidad por pesca media, pero en todos los escenarios considerados, la mortalidad por pesca actual está muy por encima del nivel correspondiente al RMSP.

Las estimaciones de reclutamiento y biomasa no fueron sensibles a la inclinación de la relación población-reclutamiento. La condición actual y las proyecciones a futuro son considerablemente más pesimistas, en términos de la condición de la población relativa a los niveles que soportan el RMSP, si existe una relación población-reclutamiento ($h = 0.75$).

Los efectos de la [Resolución C-04-09](#) de la CIAT son insuficientes para mantener a la población en los niveles que permitirán el RMSP. Si se redujera el esfuerzo a los niveles correspondientes al RMSP, la población se recuperará al nivel de SBR_{RMSP} para 2007 y seguirá por encima del mismo hasta 2011.

RESUMEN:

1. Los niveles recientes de mortalidad por pesca son casi un 50% mayores que los que corresponden al RMSP.
2. Como consecuencia, si no se reduce el esfuerzo de pesca, la biomasa total y la biomasa reproductora disminuirán a la larga al menos al nivel observado en 2004.
3. La situación actual y las proyecciones a futuro son considerablemente más pesimistas, en términos de la condición de la población, si existe una relación población-reclutamiento ($h = 0.75$).
4. Estas conclusiones son robustas a todas las formulaciones alternativas de modelo y datos consideradas en el presente análisis y en análisis previos, menos una.




FIGURE D-1. Total catches (retained catches plus discards) of bigeye tuna by the purse-seine fisheries, and retained catches for the longline fisheries, in the eastern Pacific Ocean, 1975-2005. The purse-seine catches for 1975-1992 are based on unloading data, adjusted to the species composition estimate.

FIGURA D-1. Capturas totales (capturas retenidas más descartes) de atún patudo por las pesquerías de cerco y capturas retenidas de las pesquerías palangreras en el Océano Pacífico oriental, 1975-2005. Las capturas cerqueras de 1975-1992 se basan en datos de descargas, ajustados a la estimación de la composición por especie.




FIGURE D-2. Movements of more than 1000 nm by tagged bigeye tuna in the Pacific Ocean.
FIGURA D-2. Desplazamientos de más de 1000 mn de atunes patudo marcados en el Océano Pacífico.




FIGURE D-3. Time series of average total annual fishing mortality on bigeye tuna recruited to the fisheries of the EPO. Each panel illustrates an average of four annual fishing mortality vectors that affected the fish in the range of ages indicated in the title of each panel. For example, the trend illustrated in the upper left panel is an average of the fishing mortalities that affected fish that were 1-4 quarters old.
FIGURA D-3. Series de tiempo de la mortalidad por pesca trimestral total media de atún patudo reclutado a las pesquerías del OPO. Cada recuadro ilustra un promedio de cuatro vectores trimestrales de mortalidad por pesca que afectaron los peces de la edad indicada en el título de cada recuadro. Por ejemplo, la tendencia ilustrada en el recuadro superior izquierdo es un promedio de las mortalidades por pesca que afectaron a peces de entre 1-4 trimestres de edad.




FIGURE D-4. Estimated recruitment of bigeye tuna to the fisheries of the EPO. The estimates are scaled so that the estimate of virgin recruitment is equal to 1.0. The solid line shows the maximum likelihood estimates of recruitment, and the shaded area indicates the approximate 95% confidence intervals around those estimates.

FIGURA D-4. Reclutamiento estimado de atún patudo a las pesquerías del OPO. Se escalan las estimaciones para que la estimación de reclutamiento virgen equivalga a 1,0. La línea sólida indica las estimaciones de reclutamiento de verosimilitud máxima, y el área sombreada indica los intervalos de confianza de 95% aproximados de esas estimaciones.




FIGURE D-5. Biomass trajectory of a simulated population of bigeye tuna that was not exploited during 1975-2005 (dashed line) and that predicted by the stock assessment model (solid line). The shaded areas between the two lines show the portions of the fishery impact attributed to each fishery.

FIGURA D-5. Trayectoria de la biomasa de una población simulada de atún patudo no explotada durante 1975-2005 (línea de trazos) y la que predice el modelo de evaluación (línea sólida). Las áreas sombreadas entre las dos líneas señalan la porción del impacto de la pesca atribuida a cada método de pesca.




FIGURE D-6. Estimated time series of spawning biomass ratios (SBRs) for bigeye tuna in the EPO. The dashed horizontal line (at about 0.22) identifies the SBR at AMSY. The solid line shows the maximum likelihood estimates, and the shaded areas are 95% confidence intervals around those estimates. The estimates after 2006 (the large dot) indicate the SBR predicted to occur if effort continues at the average of that observed in 2005 for purse seine and 2004 for longline, catchability (with effort deviates) continues at the average for 2003 and 2004, and average environmental conditions occur during the next 5 years.

FIGURA D-6. Serie de tiempo estimada de los cocientes de biomasa reproductora (SBR) para el atún patudo en el OPO. La línea de trazos horizontal (en aproximadamente 0.22) identifica el SBR en RMSP. La línea sólida señala las estimaciones de verosimilitud máxima, y el área sombreada representa los intervalos de confianza de 95% alrededor de esas estimaciones. Las estimaciones a partir de 2006 (el punto grande) señalan el the SBR predicho si el esfuerzo cerquero y palangrero continúa en el nivel observado en 2005 y 2004, respectivamente, la capturabilidad (con desvíos de esfuerzo) continúa en el promedio de 2003 y 2004, y con condiciones ambientales promedio en los 5 próximos años.




FIGURE D-7. Catches for 1975-2005, and predicted catches for 2006-2010, of bigeye tuna by the purse-seine and pole-and-line (upper panel) and longline (lower panel) fisheries. The predicted catches are based on average effort for 2005 for purse seine and 2004 for longline and average catchability for 2003 and 2004. The shaded areas represent 95% confidence intervals for the predictions of the future catches. Note that the vertical scales of the panels are different.

FIGURA D-7. Capturas de atún patudo registradas durante 1975-2005, y predichas para 2006-2010, por las pesquerías de cerco y de caña (recuadro superior) y palangreras (recuadro inferior). Las capturas predichas se basan en el esfuerzo medio cerquero en 2005 y palangrero en 2004 y la capturabilidad promedio de 2003 y 2004. Las zonas sombreadas representan los intervalos de confianza de 95% de las predicciones de capturas futuras. Nótese que las escalas verticales de los recuadros son diferentes.




FIGURE D-8. AMSY (upper panel), 1975-2005, and the change (increase or reduction) in the effort required to produce the AMSY (lower panel) for bigeye tuna, estimated separately for each year, using the average age-specific fishing mortality for that year.

FIGURA D-8. RMSY (recuadro superior), 1975-2005, y cambio (aumento o reducción) del esfuerzo necesario para producir el RMSY (recuadro inferior), de atún patudo, estimado por separado para cada año, usando la mortalidad por pesca promedio por edad de ese año.

TABLE D-1. Estimates of the AMSY of bigeye tuna, and associated quantities for the base case assessment and the sensitivity analysis, including a stock-recruitment relationship with a steepness (h) of 0.75. All analyses are based on average fishing mortality for 2003 and 2004. B_{2006} , B_{AMSY} , and B_0 are the biomass of bigeye 1+ years old at the start of 2006, at AMSY, and without fishing, respectively, and S_{2006} , S_{AMSY} , and S_0 are the relative number of eggs at the start of 2006, at AMSY, and without fishing, respectively. C_{2005} is the estimated total catch in 2005.

TABLA D-1. Estimaciones del RMSP de atún patudo y valores asociados para la evaluación del caso base y el análisis de sensibilidad que incluye una relación población-reclutamiento con una inclinación (h) de 0.75. Todos los análisis se basan en la mortalidad por pesca media de 2003 y 2004. B_{2006} , B_{RMSP} , y B_0 son la biomasa de patudo de edad 1+ años al principio de 2006, en RMSP, y sin pesca, respectivamente, y S_{2006} , S_{RMSP} , y S_0 son el número relativo de huevos al principio de 2006, en RMSP, y sin pesca, respectivamente. C_{2005} es la captura total estimada en 2005.

		Base case	Steepness = 0.75
		Caso base	Inclinación = 0.75
AMSY—RMSP	(t)	105,575	101,150
$B_{\text{AMSY}}—B_{\text{RMSP}}$	(t)	324,629	500,733
$S_{\text{AMSY}}—S_{\text{RMSP}}$	(t)	539	952
$B_{\text{AMSY}}/B_0—B_{\text{RMSP}}/B_0$		0.30	0.36
$S_{\text{AMSY}}/S_0—S_{\text{RMSP}}/S_0$		0.22	0.31
$C_{2005}/\text{AMSY}—C_{2005}/\text{RMSP}$		1.01	1.07
$B_{2006}/B_{\text{AMSY}}—B_{2006}/B_{\text{RMSP}}$		1.11	0.79
$S_{2006}/S_{\text{AMSY}}—S_{2006}/S_{\text{RMSP}}$		0.89	0.61
F multiplier—Multiplicador de F		0.69	0.51

E. ATÚN ALETA AZUL DEL PACÍFICO

Estudios de marcado han demostrado que ocurre intercambio de aleta azul del Pacífico entre el Océano Pacífico oriental (OPO) y occidental. Se han capturado aletas azules larvales, poslarvales, y juveniles tempranos en el Pacífico occidental pero no en el OPO, por lo que es probable que exista una sola población de aleta azul en el Océano Pacífico.

La mayoría de las capturas de aleta azul en el OPO es realizada por buques cerqueros. Casi toda la captura cerquera proviene de una zona frente a Baja California y California, a menos de unas 100 millas náuticas de la costa, entre 23°N y 35°N. Se estima que el 90% de la captura midió entre 60 y 100 cm, representando principalmente las edades 1 a 3. En los últimos años una porción considerable de la captura cerquera de aleta azul ha sido transportada a corrales marinos, donde se mantienen los peces para engordarlos y luego venderlos para *sashimi*. Se capturan cantidades menores de aleta azul con arte de pesca deportiva, redes de transmalle, y palangres. Se captura la especie en todos los meses del año, pero la mayor parte de la captura es lograda entre mayo y octubre.

El aleta azul es pescado con varias artes en el Océano Pacífico occidental desde Taiwán hasta Hokkaido. Peces de 0 años de edad de entre unos 15 y 30 cm de talla son capturados con curricán durante julio-octubre al sur de Shikoku y al sur de la Prefectura de Shizuoka. Durante noviembre-abril peces de edad 0 de entre unos 35 y 60 cm son capturados con curricán al sur y oeste de Kyushu. Peces de edad 1 y mayores son capturados con redes de cerco, principalmente durante mayo-septiembre, entre 30°-42°N y 140°-152°E. Se capturan también aletas azules de varios tamaños con trampas, redes de transmalle, y otras artes de pesca, especialmente en el Mar de Japón. Se capturan pequeñas cantidades de la especie con palangre cerca del litoral sudeste de Japón. La pesquería palangrera a pequeña escala de Taipei Chino, que se ha expandido desde 1996, captura atunes de más de 180 cm desde fines de abril hasta junio, cuando se agregan para el desove en las aguas al este del norte de Filipinas y Taiwán.

Las pesquerías palangreras de alta mar están dirigidas principalmente hacia los atunes tropicales, la albacora, y los peces picudos, pero capturan pequeñas cantidades de aleta azul del Pacífico. Buques cañeros japoneses capturan asimismo pequeñas cantidades de aleta azul en alta mar.

Estudios de marcado, con marcas convencionales y archivadoras, han arrojado una gran cantidad de información sobre el ciclo vital del aleta azul. Tal como se comentó, se supone que el desove ocurre solamente en el Pacífico occidental. Algunos peces permanecen aparentemente toda la vida en el Pacífico occidental, mientras que otros migran al OPO; estas migraciones comienzan principalmente durante el primer y segundo año de vida. Los migrantes de primer o segundo año están expuestos a varias pesquerías antes de iniciar su migración al OPO. Después de cruzar el océano, están expuestos a las pesquerías comercial y deportiva frente a California y Baja California. Posteriormente, los supervivientes regresan al Pacífico occidental.

Se encuentra el aleta azul en el OPO con mayor frecuencia en aguas de entre 17° y 23°C de temperatura de superficie. En el Pacífico occidental se encuentran peces de entre 15 y 31 cm en aguas de entre 24° y 29°C de temperatura de superficie. La supervivencia de las larvas y juveniles tempranos de la especie es indudablemente afectada de manera importante por las condiciones ambientales. Las condiciones en el Pacífico occidental afectan probablemente cuáles porciones de los peces juveniles migran al OPO, y cuándo. Asimismo, las condiciones en el OPO probablemente afectan cuándo los peces juveniles regresan al Pacífico occidental.

Se ha calculado un índice de abundancia para el aleta azul predominantemente joven en el OPO, basado en una estandarización de la captura por día de buque usando un modelo lineal generalizado, y incluyendo las variables latitud, longitud, TSM, TSM², mes, y número de identificación del buque. El índice es altamente variable, pero señala un pico a principios de los años 1960, niveles muy bajos durante un período a principios de los años 1980, y cierto aumento desde entonces.

Una evaluación de la población realizada por el Comité Científico Internacional del Pacífico Norte indicó

que la biomasa de la población reproductora mostró picos locales a principios de los años 1960 y a fines de los 1970 y 1990, con una disminución después del último pico, pero la fuerza relativo de estos picos es altamente incierta. Se estimó que el reclutamiento fue altamente variable, con de cuatro a siete cohortes fuertes producidas entre 1960 y 2003. Un evento fuerte de reclutamiento que parece haber ocurrido en 2001 mantendría a la biomasa de la población reproductora por encima de los niveles recientes hasta 2010. Es necesario más trabajo para establecer las bases científicas para cualquier acción de ordenación.

Las capturas totales de aleta azul han fluctuado considerablemente en los últimos 50 años (Figura E-1). La presencia de años consecutivos de capturas superiores al promedio (mediados de la década de 1950 a mediados de la siguiente) e inferiores al mismo (principios de los 1980 a principios de los 1990) podría deberse a años consecutivos de reclutamiento superior e inferior al promedio. Los resultados de análisis de rendimiento por recluta y de cohortes indican que sería posible obtener capturas mayores si se redujeran o eliminaran las capturas de peces de edad 0 y de edad 1.

Los análisis reproductor-recluta no indican que aumentaría el reclutamiento del aleta azul del Pacífico si se permitiera a más peces desovar.




FIGURE E-1. Retained catches of Pacific bluefin, 1952-2004.
FIGURA E-1. Capturas retenidas de aleta azul del Pacífico, 1952-2004.

F. ATÚN ALBACORA

Hay dos poblaciones de atún albacora en el Océano Pacífico, una en el hemisferio norte y la otra en el hemisferio sur. La especie es capturada con palangre en la mayor parte del Pacífico Norte y Sur, pero rara vez entre aproximadamente 10°N y 5°S, con curricán en el Pacífico oriental, Norte central y Sur central, y con caña en el Pacífico Norte occidental. En el Pacífico Norte un 60% del pescado es capturado con caña y curricán, que capturan albacora más joven de menor tamaño, mientras que en el Pacífico Sur un 90% de la captura de albacora es tomada con palangre. Las capturas totales anuales de albacora del Pacífico Norte alcanzaron su nivel máximo de más de 125.000 t anuales en 1976, y luego disminuyeron. En los años 1990 volvieron a aumentar, y en 1999 alcanzaron 121.500 t (Figura F-1a). Las capturas anuales totales de albacora del Pacífico Sur han variado entre unas 25 mil y 55 mil t desde 1980 (Figura F-1b).

El atún albacora juvenil y adulto es capturado principalmente en la Corriente de Kuroshio, la Zona de Transición del Pacífico Norte, y la Corriente de California en el Pacífico norte y la Zona de Convergencia Subtropical en el Pacífico sur, pero el desove ocurre en aguas tropicales y subtropicales, y se centra en los paralelos de 20°N y 20°S. Se cree que el albacora del Pacífico Norte desova entre marzo y julio en el Pacífico occidental y central.

Los desplazamientos del albacora del Pacífico Norte son fuertemente afectados por las condiciones oceánicas, y los migrantes suelen estar concentrados en frentes oceánicos en la Zona de Transición del Pacífico Norte. La mayoría de las capturas tienen lugar en aguas de entre 15° y 19.5°C. No quedan claros los detalles de la migración, pero se cree que peces juveniles (de entre 2 y 5 años de edad) se trasladan al Pacífico oriental en la primavera y a principios del verano, y vuelven al Pacífico occidental y central, tal vez anualmente, a fines de otoño y en el invierno, donde suelen permanecer cuando maduran. Se ha propuesto la hipótesis de dos subgrupos de albacora del Pacífico Norte, separados en 40°N en el Pacífico oriental, y que el subgrupo del norte tiene la mayor probabilidad de migrar al Pacífico occidental y central.

Se sabe menos acerca de los desplazamientos de albacora en el Pacífico sur. Los juveniles se desplazan de los trópicos hacia el sur cuando miden unos 35 cm, y luego hacia el este por la Zona de Convergencia Subtropical hasta aproximadamente 130°O. Poco antes de alcanzar la madurez vuelven a los trópicos, donde desovan. Marcas fijadas en peces liberados al este de 155°O fueron recuperadas generalmente en lugares al este y norte del punto de liberación, mientras que aquéllas fijadas al oeste de 155°O fueron recuperadas generalmente en lugares al oeste y norte del punto de liberación.

En 2002 y 2003 fueron presentadas nuevas evaluaciones por edad de las poblaciones de albacora del Pacífico Sur y Norte, respectivamente.

La evaluación del Pacífico Sur, realizada con MULTIFAN-CL por la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, incorporó datos de captura y esfuerzo, frecuencia de talla, y marcado. Se estimó que la población está bastante por encima del nivel correspondiente al rendimiento máximo sostenible promedio (RMSP). Las capturas seguirían aumentando con aumentos del esfuerzo, aunque no se sabe bien hasta cuál punto el rendimiento podría aumentar de forma sostenible. Aunque se estima que los reclutamientos recientes fueron ligeramente inferiores al promedio, no parece haber en la actualidad ninguna necesidad de limitar la pesca de albacora en el Pacífico Sur.

Durante la 19ª Reunión Técnica sobre el Albacora del Pacífico Norte en 2004 se realizaron análisis de poblaciones virtuales de dicha población. La biomasa estimada de 2004, 438.000 t (Figura F-2), es un 25% mayor que la que se estimó para 1975, el primer año del período modelado. Los reclutamientos estimados desde 1990 fueron generalmente mayores que los de la década de 1980, y las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) de la mayoría de las pesquerías cañeras y curricaneras han aumentado en los últimos años. No obstante, las CPUE palangreras han disminuido desde mediados de los años 1990. La reunión estimó tasas de mortalidad por pesca (F) baja (0,43) y alta (0,68) con pleno reclutamiento, y notó que si F continúa en los niveles supuestos, es poco probable que la biomasa de la población reproductora (*spawning stock biomass*, SSB) se recupere al niveles de SSB_{RMSP} en un período de cinco años.

La reunión de 2005 del Comité Científico Internacional sobre los Atunes

y Especies Afines en el Océano Pacífico Norte (ISC) asesoró como sigue:

“El SSB futuro puede ser mantenido en el SSB mínimo ‘observado’ (43.000 t en 1977), o por encima de ese nivel, con F ligeramente más altos que el rango de F actuales. Sin embargo, las estimaciones de SSB más bajas observadas ocurrieron todas a fines de la década de 1970 y podrían ser las estimaciones menos confiables de SSB. Un nivel umbral de SSB más robusto podría basarse en el 10° o 25° percentil inferior del SSB ‘observado’. Si se hiciera esto, el F actual debería mantener el SSB en, o por encima de, el umbral del 10° percentil pero una modesta reducción del F actual podría ser necesaria para mantener el SSB en o por encima del umbral del 25° percentil.”

El personal de la CIAT considera que el nivel más alto de F actual (0,68) es más probable, con base en los métodos usados para calcular las estimaciones. Además, es posible que hasta la estimación alta sea demasiado baja, dado el sesgo retrospectivo demostrado por el modelo. Según las estimaciones de la 19ª Reunión Técnica, la F actual de 0,68 implica una biomasa de equilibrio de la población reproductora en el 17% de los niveles sin explotación, y las proyecciones que suponen una F de 0,68, con escenarios altos y bajos de reclutamiento futuro, sugieren que la biomasa podría disminuir si persisten los niveles actuales de mortalidad por pesca.




FIGURE F-1a. Retained catches of North Pacific albacore, 1950-2004.

FIGURA F-1a. Capturas retenidas de albacora del Pacífico norte, 1950-2004.




FIGURE F-1b. Retained catches of South Pacific albacore, 1950-2004.

FIGURA F-1b. Capturas retenidas de albacora del Pacífico sur, 1950-2004.




FIGURE F-2. Time series of total biomass (B), and spawning stock biomass (SSB) of North Pacific albacore tuna, in metric tons (t), from the North Pacific Albacore Workshop analyses of 2004 and 2002. The time series for B are based on estimates of January 1 biomass, and those for SSB on estimates at the beginning of the spawning season (“mid-year”).

FIGURA F-2. Serie de tiempo de la biomasa total (B) y biomasa de la población reproductora (SSB) del atún albacora del Pacífico Norte, en toneladas métricas (t), de los análisis de la Reunión Técnica sobre el Albacora del Pacífico Norte de 2004 y 2002. Las series de tiempo B se basan en estimaciones de la biomasa al 1 de enero, y aquéllas de SSB en estimaciones al principio de la temporada de desove (“medio año”).

G. PEZ ESPADA

El pez espada (*Xiphias gladius*) ocurre en todo el Océano Pacífico entre 50°N y 50°S, aproximadamente. Es capturado principalmente por las pesquerías palangreras de países de Lejano Oriente y del hemisferio occidental. Las pesquerías de red de trasmalle y arpón capturan cantidades menores. Es rara vez capturado en la pesca deportiva. En los últimos tres años buques de Chile, España y Japón lograron las mayores capturas en el OPO, en conjunto un 70% de la captura total en la región. El pez espada es el objetivo de las pesquerías española y chilena, mientras que es capturado incidentalmente en la pesquería japonesa, cuyo objetivo principal es el atún patudo. Otras naciones con pesquerías dirigidas hacia el pez espada son México y Estados Unidos.

El pez espada alcanza la madurez a la edad de 5 a 6 años, cuando mide unos 150 a 170 cm de talla. Es probable que desove más de una vez por temporada. Ocurren frecuentemente proporciones desiguales de sexos. En el caso de peces de más de 170 cm, la proporción de hembras aumenta con el aumento en la talla.

Existen solamente datos fragmentarios sobre los desplazamientos del pez espada. Suele permanecer a mayor profundidad de día que de noche.

El pez espada suele vivir en zonas frontales. Hay varias en el Océano Pacífico oriental (OPO), entre ellas zonas frente a California y Baja California, frente a Ecuador, Perú, y Chile, y en el Pacífico ecuatorial. El pez espada tolera temperaturas de entre unos 5° y 27°C, pero su rango óptimo es de 18° a 22°C. Se han encontrado larvas de la especie únicamente a temperaturas de más de 24°C.

Se considera, a partir de datos genéticos y de la pesca, que hay dos poblaciones de pez espada en el OPO, al norte y al sur de 3°N. Además, es posible que una población del Pacífico noroeste se desplace al OPO en varias ocasiones.

Los resultados de un modelado preliminar con MULTIFAN-CL de una población de pez espada del Pacífico Norte en el área al norte de 10°N y al oeste de 135°O indican que en los últimos años el nivel de biomasa ha sido estable y ha estado por encima del 50% del nivel de la biomasa no explotada, lo cual indica que con los niveles actuales de esfuerzo de pesca, la explotación de estos peces espada no es excesiva.

Las tasas de captura por unidad de esfuerzo estandarizadas de las pesquerías palangreras en la región norte del OPO, y las tendencias en la abundancia relativa derivadas de las mismas, no señalan que la abundancia esté disminuyendo. Intentos de ajuste de modelos de producción a los datos, con tasas de mortalidad natural razonables supuestas, no produjeron estimaciones de parámetros de ordenación (rendimiento máximo sostenible promedio (RMSP), por ejemplo), debido a la falta de contraste en las tendencias. Esta falta de contraste sugiere que las pesquerías en esta región no son de magnitud suficiente como para causar reacciones significativas en la población. A partir de estas consideraciones, y la estabilidad histórica de las capturas en la región norte (Figura G-1), parece que la pesca del pez espada no es excesiva en la región norte del OPO.

Se realizó una evaluación de la población sureña del pez espada en el OPO, usando *Stock Synthesis II* (SS2), versión 1.23b, con los resultados preliminares siguientes. La biomasa de la población ha pasado por cambios considerables, y se encuentra actualmente en un nivel de disminución moderado. Hay evidencias fuertes de que una ó dos cohortes fuertes ingresaron a la pesquería recientemente, pero su fuerza es incierta. Se estima que la tendencia del cociente de biomasa reproductora (el cociente de la biomasa reproductora actual a la de la población no explotada, denominado SBR (*spawning biomass ratio*)) de esta población fue entre 0,5 y 0,9 durante todo el período observado (1945-2003), y que alcanzó su nivel mínimo a mediados de los años 1960 y de nuevo a mediados de los 1990.

El RMSP de la población sureña del pez espada en el OPO es aproximadamente 13.000–14.000 t, y el SBR en RMSP es aproximadamente 0,26. Se estima que la biomasa reproductora actual es bien mayor a

la que proveería el RMSP.

La captura anual media de esta población durante 1993–2000 fue aproximadamente 6.900 t (rango: ~ 4.800–8.600 t). Las capturas en los últimos años han sido alrededor de 12.000–13.000 t (Figura G-1), o aproximadamente la captura de RMSP. Ha habido indicaciones de mayor eficacia en la pesca dirigida al pez espada en el sur del OPO, resultando en mayores capturas de esta población. Parte del aumento podría ser debido al mayor reclutamiento antes comentado. No se espera que mayores aumentos de los niveles de captura observados en los últimos años sean sostenibles.

No se ha intentado estimar el nivel de RMSP que podría conseguir cada pesquería si operase exclusivamente, pero es probable que las pesquerías que capturan los peces más jóvenes (las pesquerías palangreras de Chile, España y Japón, por ejemplo) sean menos eficaces con respecto a la maximización del rendimiento.




FIGURE G-1. Retained catch of swordfish in the eastern Pacific Ocean, 1945-2004, by stock (north and south).

FIGURA G-1. Captura retenida de pez espada en el Océano Pacífico oriental, 1945-2004, por población (norte y sur).

H. MARLÍN AZUL

La mejor información ahora disponible indica que el marlín azul (*Makaira nigricans*) constituye una sola especie a nivel mundial, y que existe una sola población de la especie en el Océano Pacífico. Por este motivo, se compilan estadísticas de capturas (Figura H-1), y se realizan análisis de la condición de la población, para el Océano Pacífico entero, aunque es importante saber cómo han variado con el tiempo las capturas en el Pacífico oriental (Figura H-2).

El marlín azul es capturado por buques palangreros de muchas naciones que pescan atunes y peces picudos entre aproximadamente 50°N y 50°S. Las pesquerías deportivas y varias otras pesquerías comerciales capturan cantidades menores.

Pequeñas cantidades de marlines azules han sido marcadas con marcas convencionales, principalmente por pescadores deportivos. Algunos de estos peces han sido recapturados a grandes distancias del punto de liberación. Además, se han marcado marlines azules con marcas acústicas y se han seguido sus actividades durante períodos cortos.

El marlín azul vive generalmente en regiones con temperaturas superficiales del mar (TSM) de más de 24°C, y pasa un 90% del tiempo a profundidades donde la temperatura es de 1° a 2° menos que la TSM.

Se usó el modelo de poblaciones con retardos temporales de Deriso y Schnute, una forma de modelo de producción, para evaluar la condición de la población de marlín azul en el Océano Pacífico. Se usaron datos de las capturas anuales totales estimadas para 1951-1997 y la captura por unidad de esfuerzo estandarizada elaborada de datos de captura y esfuerzo de pesca nominal de la pesquería palangrera japonesa de 1955-1997. Se concluyó que los niveles de biomasa y esfuerzo de pesca eran cercanos a aquéllos correspondientes al rendimiento máximo sostenible promedio (RMSP).

Un análisis más reciente, usando MULTIFAN-CL, fue realizado para evaluar las poblaciones de marlín azul en el Océano Pacífico y evaluar la eficacia de la estandarización basada en hábitat del esfuerzo palangrero. Existe una incertidumbre considerable con respecto a los niveles de esfuerzo de pesca que producirían el RMSP. Sin embargo, se determinó que marlín azul en el Océano Pacífico está casi plenamente explotado, es decir, la población está cerca de la cima de la curva de rendimiento. Se descubrió también que la estandarización del esfuerzo, usando un modelo basado en hábitat, permitió estimar los parámetros dentro de límites razonables y con intervalos de confianza reducidos alrededor de las estimaciones.

Históricamente, las pesquerías en el OPO han capturado del 10 al 18% de la captura total de marlín azul del Océano Pacífico; en el quinquenio más reciente fueron en promedio unas 3.000 toneladas, o un 14% de la captura total.




FIGURE H-1. Retained catches of blue marlin in the Pacific Ocean, 1964-2003.

FIGURA H-1. Capturas retenidas de marlín azul en el Océano Pacífico, 1964-2003.




FIGURE H-2. Retained catches of blue marlin in the eastern Pacific Ocean, 1976-2004, by gear type.

FIGURA H-2. Capturas retenidas de marlín azul en el Océano Pacífico oriental, 1976-2004, por arte de pesca.

I. MARLÍN RAYADO

El marlín rayado (*Tetrapturus audax*) ocurre por todo el Océano Pacífico entre 45°N y 45°S. Es capturado principalmente por las pesquerías palangreras de naciones de Lejano Oriente y del hemisferio occidental. Las pesquerías de red de transmalle, deportiva, y otras capturan cantidades menores. En años recientes las pesquerías de la República de Corea, Costa Rica, y Japón han realizado las mayores capturas en el Océano Pacífico oriental (OPO) (Figura I-1).

El marlín rayado alcanza la madurez cuando mide unos 140 cm de talla, y el desove ocurre en zonas ampliamente esparcidas del Océano Pacífico.

La estructura de la población de marlín rayado es incierta. Existen indicaciones de que ocurre solamente intercambio limitado de la especie entre el OPO y el Pacífico central y occidental, por lo que se considera en este informe que estudios de reducciones locales y evaluaciones independientes del marlín rayado del OPO son importantes. Un análisis de las tendencias de la captura por unidad de esfuerzo en varias sub-áreas señaló que los peces en el OPO constituyen una sola población. Estudios genéticos sugirieron que hay poblaciones separadas en el Pacífico Sur oriental y occidental y que pudiera haber poblaciones separadas centradas en la región cerca de Hawai en el Pacífico central norte y cerca de Ecuador y México en el OPO, pero los resultados preliminares de análisis más recientes sugieren que los peces en la región de Ecuador y México son de una sola población.

Se dispone de pocos datos de marcado del marlín rayado. Se realizó la mayoría de las recapturas de peces marcados liberados frente a la punta de la península de Baja California en la misma zona general de liberación, pero otros fueron recapturados cerca de las Islas Revillagigedo, otros cerca de Hawai, y uno cerca de la Isla de Norfolk, al norte de Nueva Zelanda.

Por estos motivos las conclusiones alcanzadas por un modelo de una sola población en el OPO, seleccionado sobre la base de tendencias en tasas de captura, deben ser consideradas preliminares.

Se obtuvieron tasas de captura estandarizadas de un modelo lineal general y de un método estadístico de estandarización basado en hábitat. Análisis de la condición de la población realizados con dos modelos de producción, tomando en cuenta el período cuando peces picudos eran objetivo de la pesca palangrera en el OPO, fueron considerados los más verosímiles. Un modelo de Pella-Tomlinson produjo estimaciones del rendimiento máximo sostenible promedio (RMSP) de entre 3,700 y 4,100 t, con la biomasa actual en un 47% de la biomasa no explotada. Se estima que la biomasa actual es mayor que la que produciría el RMSP. Un análisis usando el modelo con retardos temporales de Deriso y Schnute produjo estimaciones de RMSP de entre 8,700 y 9,200 t, con la biomasa actual mayor que la necesaria para producir el RMSP y un 70% del tamaño de la biomasa no explotada.

El Comité Científico Internacional sobre los Atunes y Especies Afines en el Océano Pacífico Norte (ISC) realizó un análisis de la condición de una población hipotética de marlín rayado que abarca el Pacífico norte. Los resultados de todos los modelos de evaluación indicaron que la biomasa ha sido reducida. En el caso de los modelos que producen estimaciones de la biomasa actual relativa a la inicial, los resultados indicaron que la población ha disminuido al 10-45% de su biomasa inicial. Por contraste, si se divide la serie de abundancia a mediados de los años 1970, y se supone que esto representa un cambio en el blanco de la pesquería, el resultado es más optimista (biomasa actual mayor que la biomasa en RMSP). Aunque los resultados de estas evaluaciones son considerados provisionales, el ISC recomendó que no se permitiera a la mortalidad por pesca del marlín rayado en el Pacífico norte rebasar los niveles actuales.

Los resultados de las evaluaciones del OPO y el Pacífico norte son consistentes. La población de marlín rayado en el OPO está probablemente en buen estado, en el nivel de RMSP o por encima del mismo.

Las capturas y el esfuerzo de pesca estandarizado de marlín rayado disminuyeron en el OPO entre 1990-1991 y 1998, y esta disminución ha continuado, con las capturas anuales durante 2000-2003 entre unas 2.000 y 2.100 toneladas, nivel muy inferior al RMSP estimado. Esto podría resultar en un aumento conti-

nuado de la biomasa de la población en el OPO.




FIGURE I-1. Retained catches of striped marlin in the eastern Pacific Ocean, 1976-2004, by gear type.

FIGURA I-1. Capturas retenidas de marlín rayado en el Océano Pacífico oriental, 1976-2004, por arte de pesca.

J. CONSIDERACIONES DE ECOSISTEMA

1. Introducción	84
2. Impacto de las capturas	84
3. Otros componentes del ecosistema	90
4. Interacciones tróficas.....	92
5. Ambiente físico	93
6. Indicadores agregados	94
7. Modelado de ecosistemas.....	95
8. Acciones de la CIAT y el APICD relativas a consideraciones de ecosistema	96
9. Acontecimientos futuros	98

1. INTRODUCCIÓN

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO dispone que la ordenación de pesquerías debería asegurar la conservación de no sólo las especies objetivo, sino también de las otras especies que pertenecen al mismo ecosistema. En 2001, la Declaración de Reykiavik sobre la Pesca Responsable en el Ecosistema elaboró esta norma con un compromiso de incorporar un enfoque de ecosistema en la ordenación de las pesquerías.

La CIAT ha tomado cuestiones de ecosistema en cuenta en muchas de sus decisiones, pero hasta hace poco no había enfocado su atención en el ecosistema entero en el que viven las especies objetivo, los atunes y peces picudos. Esta sección brinda un panorama coherente, resumiendo los conocimientos del impacto directo de la pesca sobre varias especies y grupos de especies en el ecosistema, y presenta los conocimientos del medio ambiente y de otras especies que no son afectadas directamente por la pesca. Tiene como objeto brindar a la Comisión la oportunidad de considerar el ecosistema entero como parte de su consideración de la condición de las poblaciones de atunes y peces picudos y de medidas de ordenación.

Este análisis no sugiere objetivos para la incorporación de consideraciones de ecosistema en la ordenación de las pesquerías de atunes o peces picudos ni nuevas medidas de ordenación. Su propósito principal es más bien brindar a la Comisión la oportunidad de asegurar que dichas consideraciones sean claramente parte de su agenda.

Es importante tener en cuenta que la perspectiva que tenemos del ecosistema se basa en el pasado reciente; disponemos de muy poca información sobre el ecosistema antes de que comenzara la explotación. Además, el medio ambiente está sujeto a cambios en varias escalas temporales, entre ellas las conocidas fluctuaciones de El Niño y cambios a plazo mayor recientemente reconocidos, tales como la Oscilación Decadal del Pacífico y otros cambios climáticos.

Además de reportar las capturas de las especies principales de atunes y peces picudos, el personal reporta las capturas incidentales de otras especies que normalmente son descartadas. En la presente sección, se presentan datos sobre dichas capturas incidentales en el contexto del efecto de la pesca sobre el ecosistema. Desgraciadamente, mientras que se cuenta con información relativamente buena para los atunes y peces picudos, no se dispone de información para la pesquería entera. La información es completa para los buques cerqueros grandes (de más de 363 toneladas de capacidad de acarreo) que llevan observadores bajo el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), y se registra información sobre capturas retenidas también para otros buques cerqueros, barcos cañeros, y gran parte de la flota palangrera. Se dispone de cierta información sobre tiburones retenidos por partes de la flota palangrera. Se cuenta también con información sobre capturas incidentales y descartes de los cerqueros grandes y de algunos de menor tamaño. Se dispone de poca información sobre las capturas incidentales y descartes de otros buques pesqueros.

2. IMPACTO DE LAS CAPTURAS

2.1. Evaluaciones de especies individuales

Esta sección presenta un resumen de la información actual sobre el efecto de las pesquerías atuneras sobre

las poblaciones de especies individuales en el Océano Pacífico oriental (OPO). Se enfoca en la biomasa actual de cada población considerada comparada con lo que hubiera sido en ausencia de una pesquería. La intención es señalar cómo la pesca puede haber alterado los componentes del ecosistema, y no evaluaciones detalladas, presentadas en otras secciones de este informe y en otros documentos de la Comisión. En la sección siguiente se hace referencia a menudo a comparaciones con el tamaño estimado de la población sin explotación. No hay medidas directas de este tamaño, y en todo caso hubiese variado entre años. Además, el tamaño de la población sin explotación podría ser afectado por la abundancia de los depredadores y las presas, la cual no es incluida en los análisis de las especies individuales.

2.1.1. Atunes

2.1.1.a Aleta amarilla (*Thunnus albacares*)

Desde 1984 la población de aleta amarilla ha estado cerca o por encima del nivel correspondiente al rendimiento máximo sostenible promedio. Para lograr este objetivo, el tamaño de la población reproductora necesita ser mantenido en más del 37% de su tamaño sin explotación con la combinación actual de métodos de pesca. Una estimación del efecto de este tamaño de población reducido es que la depredación por el aleta amarilla sobre otras partes del ecosistema es reducida a aproximadamente el 30% de lo que fue en ausencia de una pesquería.

2.1.1.b Barrilete (*Katsuwonus pelamis*)

Las evaluaciones del barrilete son mucho menos ciertas que las de aleta amarilla y patudo, en parte porque la pesquería en el OPO no parece tener mucho impacto sobre la población. Sin embargo, parece que fluctuaciones en el reclutamiento causan grandes variaciones en el tamaño de la población. En 2003, se estimó que la biomasa de la población era un 60% de lo que sería en ausencia de la pesquería bajo condiciones promedio.

2.1.1.c Patudo (*Thunnus obesus*)

Hasta 1993, el patudo fue capturado principalmente por la pesquería palangrera, y se estima que en ese año el tamaño de la población era el 28% de su tamaño sin explotación. A partir de 1993, la pesca con red de cerco de atunes asociados con dispositivos agregadores de peces (plantados) capturó cantidades importantes de patudo pequeño y mediano. En 2004, después de varios años de reclutamiento pobre y niveles excesivos de mortalidad por pesca, se estimó que el tamaño de la población era un 13% de su tamaño sin explotación. Due to recent spikes in recruitment, the current level has increased to 20%.

2.1.1.d Aleta azul del Pacífico (*Thunnus orientalis*)

Es probable que haya una sola población de atún aleta azul del Pacífico en el Océano Pacífico, dado que se sabe que el desove ocurre solamente en el Pacífico occidental. Los estudios de marcado han demostrado que existe intercambio de aletas azules entre el Pacífico oriental y occidental. Una evaluación preliminar de la población, realizada por el Comité Científico Internacional sobre los Atunes y Especies Afines en el Océano Pacífico Norte (ISC) en 2005, ha indicado que la biomasa de la población reproductora mostró picos locales a principios de los 1960, fines de los 1970 y fines de los 1990, con una disminución después del último pico. Un evento de reclutamiento fuerte que posiblemente ocurrió en 2001 mantendría a la biomasa de la población reproductora por encima de los niveles recientes hasta 2010.

2.1.1.e Albacora (*Thunnus alalunga*)

En general, se considera que hay dos poblaciones de albacora en el Océano Pacífico, una en el Pacífico Norte y la otra en el Pacífico Sur. Una evaluación de la población del sur, realizada por la Secretaría de la Comunidad del Pacífico en 2003, señaló que estaba en un 60% de su tamaño no explotado. Una evaluación por el 19° *North Pacific Albacore Workshop* en 2004 indicó de la población del norte está en un 45% de dicho tamaño.

2.1.2. Peces picudos

2.1.2.a Pez espada (*Xiphias gladius*)

Las poblaciones de pez espada del Océano Pacífico nordeste y sudeste son identificables a partir de análisis genéticos y de la pesca. Análisis preliminares de la condición de la población del Pacífico sudeste indican que la biomasa reproductora ha disminuido de forma significativa durante el período de 1945-2003, y está ahora en aproximadamente el doble del nivel que produciría el rendimiento máximo sostenible promedio (RMSP = 13.000–14.000 t). Las capturas han aumentado sustancialmente desde 2001, y recientemente han estado por las 14.000–15.000 t anuales.

Las variaciones en la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) estandarizada de pez espada en el OPO norte no muestran ninguna tendencia, lo cual sugiere que las capturas hasta la fecha no han afectado la población de forma significativa.

2.1.2.b Marlín azul (*Makaira nigricans*)

Evaluaciones recientes de la población de marlín azul sugieren que su tamaño actual está entre el 50 y 90% de su tamaño no explotado.

2.1.2.c Marlín rayado (*Tetrapturus audax*)

Análisis genéticos preliminares sugieren que hay poblaciones separadas de marlín rayado en el Océano Pacífico. Las evaluaciones para una población en el OPO sugirieron que el tamaño actual está entre el 50 y 70% del tamaño no explotado. Recientemente se realizó un análisis de la condición de una población hipotética que abarca el Pacífico norte entero; los resultados, aunque provisionales, sugirieron una disminución en el tamaño de la población.

2.1.2.d Marlín negro (*Makaira indica*), pez vela (*Istiophorus platypterus*), y marlín trompa corta (*Tetrapturus angustirostris*)

No se han realizado recientemente evaluaciones de las poblaciones de estas especies, pero hay ciertos datos, presentados en la serie de Boletines de la CIAT publicados conjuntamente por científicos del Instituto Nacional de Investigación de Pesquerías de Ultramar (NRIFSF) del Japón y la CIAT, que indican tendencias en capturas, esfuerzo, y CPUE.

2.1.3. Resumen

Las capturas estimadas¹ (incluyendo descartes de la pesca de cerco), en toneladas, de atunes y peces picudos en el OPO en 2005 son:

	PS			LP	LL	OTR	Total
	OBJ	NOA	DEL				
Atún aleta amarilla	30,326	74,302	166,630	2,067	128	1,555	275,007
Atún barrilete	147,278	119,851	12,085	1,039	16	1,418	281,687
Atún patudo	70,787	1,399	3	0	32,082	0	104,270
Aleta azul del Pacífico	0	3,845	0	0	0	95	3,940
Atún albacora	0	0	0	18	42	73	133
Pez espada	1	1	1	0	199	77	279
Marlín azul	392	15	15	0	0	0	423
Marlín rayado	13	7	13	0	0	0	32
Marlín negro	74	8	18	0	0	0	100
Pez vela	4	6	35	0	17	0	62
Marlín trompa corta	<1	<1	1	0	0	0	1

¹ Datos preliminares

2.2. Mamíferos marinos

En el OPO, se encuentran frecuentemente mamíferos marinos, especialmente delfines manchados (*Stenella attenuata*), tornillo (*S. longirostris*), y comunes (*Delphinus delphis*), asociados con atunes aleta amarilla de entre unos 10 y 40 kg. Los pescadores con red de cerco descubrieron que podían lograr las capturas máximas de aleta amarilla en el OPO si cercaran manadas de delfines asociadas con atunes, y luego liberaran los delfines sin dejar al pescado escapar. La mortalidad incidental de delfines en esta operación fue alta en los primeros años de la pesquería, y las poblaciones de delfines fueron reducidas de sus niveles sin explotación durante las décadas de 1960 y 1970. A partir de fines de la década de los 1980 la mortalidad incidental disminuyó precipitadamente, y ahora hay evidencias de una recuperación de las poblaciones. En la tabla se presenta la estimación preliminar de la mortalidad de delfines ocasionada por la pesca en 2005.

Los estudios de la asociación de atunes con delfines forman un componente importante del enfoque a largo plazo del personal para comprender las interacciones clave en el ecosistema. El grado al cual los atunes aleta amarilla y los delfines compiten por recursos, o si uno u otro se beneficia de la interacción, constituyen información crítica, en vista de la gran biomasa de ambos grupos, y su altas tasas de consumo de presas. Análisis de la dieta y de isótopos estables de atunes aleta amarilla y delfines manchado y tornillo capturados en agregaciones multiespecíficas por buques cerqueros en el OPO demuestran diferencias importantes en los hábitos de alimentación y en la posición trófica de las tres especies, lo cual sugiere que la asociación atún-delfín probablemente no es mantenida por ventajas de alimentación. Esta conclusión es apoyada por estudio de rastreo por radio de delfines manchados con grabadoras de tiempo y profundidad, que indican que los delfines se alimentan principalmente de noche con organismos asociados con la capa profunda de dispersión, mientras que estudios de los hábitos de alimentación del atún aleta amarilla señalan una alimentación principalmente diurna.

Durante 2003, científicos del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS) de EE.UU. realizaron un crucero de investigación como parte de la serie del *Stenella Abundance Research Project* (STAR). La meta principal de este estudio plurianual es investigar tendencias en el tamaño de las poblaciones de delfines que son capturadas incidentalmente en la pesquería de cerco en el OPO. Durante STAR 2003, se tomaron datos sobre la distribución y el tamaño y composición de manadas de cetáceos para estimar la abundancia de los delfines. Los datos de los estudios de transectos lineales a gran escala produjeron estimaciones iniciales de abundancia para 10 especies y/o poblaciones de delfines. Las estimaciones para los delfines manchado nordeste de altamar y tornillo oriental en 2003 fueron algo mayores que aquéllas de los estudios previos en 1998-2000, y regresiones lineales ponderadas indicaron una pequeña tendencia positiva en la abundancia durante el período de 1979-2003. Las estimaciones para los delfines manchado de altamar occidental/sureño, tornillo panza blanca, listado (*S. coeruleoalba*), de dientes rugosos (*Steno bredanensis*), común, tonina (*Tursiops truncatus*), y de Risso (*Grampus griseus*), fueron generalmente similares a estimaciones previas basadas en los mismos métodos.

Especie y población	Mortalidad incidental	
	número	t
Delfín manchado de altamar		
Nororiental	274	18
Occidental/sureño	99	6
Delfín tornillo		
Oriental	274	12
Panza blanca	115	7
Delfín común		
Norteño	114	8
Central	57	4
Sureño	154	11

Otros delfines ²	64	4
Total	1,151	70

Científicos del NMFS han calculado estimaciones de la abundancia de varias otras especies de mamíferos marinos a partir de datos de cruceros de investigación realizados entre 1986 y 2000 en el OPO. Los cruceros STAR de 2003 y 2006 proveerán más estimaciones de la abundancia de estos mamíferos. De las especies no afectadas significativamente por la pesquería atunera, las ballenas piloto de aletas cortas (*Globicephala macrorhynchus*) y tres poblaciones de delfines comunes presentaron tendencias crecientes en abundancia durante esos 15 años. La mayor abundancia aparente de estos mamíferos podría haber causado una disminución en la capacidad de carga del OPO para otros depredadores que comparten su dieta, entre ellos el delfín manchado. La abundancia estimada de la ballena de Bryde (*Balaenoptera edeni*) también aumentó, pero se solapan muy poco las dietas de estas ballenas barbadas y de los depredadores de alto nivel afectados por las pesquerías. La abundancia estimada del delfín listado (*Stenella coeruleoalba*) no demostró ninguna tendencia clara con el tiempo, y las estimaciones de abundancia del cachalote (*Physeter macrocephalus*) han tendido a disminuir en los últimos años.

Ciertos mamíferos marinos son afectados adversamente por la reducción en la disponibilidad de alimento durante eventos de El Niño, especialmente en ecosistemas costeros. Ejemplos documentados incluyen delfines y pinnípedos frente a Perú, pinnípedos en las Islas Galápagos, y ballenas de Bryde frente a Perú. Las ballenas grandes pueden desplazarse en reacción a cambios en la productividad y distribución de sus presas.

2.3. Tortugas marinas

Las tortugas marinas son capturadas en los palangres cuando toman el cebo en los anzuelos, se traban al dar accidentalmente con un anzuelo, o se enredan en una línea. Hay pocas estimaciones de la mortalidad incidental de tortugas causada por la pesca con palangre o red de transmalle. En la [4ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental de la CIAT](#) en enero de 2004 se informó que la captura incidental de tortugas en la pesquería palangrera japonesa en el OPO en 2000 consistió de 166 tortugas laúd (*Dermochelys coriacea*), de las cuales 25 estaban muertas, y unas 6,000 tortugas de todas las otras especies, principalmente golfinas (*Lepidochelys olivacea*), de las cuales aproximadamente la mitad estaba muerta. Es probable que las tasas de mortalidad sean similares para otras flotas que pescan atún patudo, y posiblemente mayores que aquéllas flotas que pescan albacora y pez espada a menor profundidad. Unos 23 millones de los 200 millones de anzuelos calados cada año en el OPO por buques palangreros de aguas lejanas están dirigidos hacia el pez espada en palangres poco profundos.

Además, hay una flota considerable de buques palangreros basados en puertos locales que pescan atunes y peces picudos en el OPO. Durante 2005, el personal de la CIAT y otras organizaciones brindaron asesoramiento y ayuda a los gobiernos de varias naciones de Latinoamérica que lindan con el Océano Pacífico para reducir la mortalidad de tortugas marinas causada por la pesquería palangrera artesanal de atunes y otras especies. En la sección 8.2 se presenta información adicional sobre este programa.

Las tortugas marinas son capturadas ocasionalmente en redes de cerco en la pesquería atunera del OPO. La mayoría de las interacciones ocurren cuando las tortugas se asocian con objetos flotantes, y son capturados cuando el objeto es cercado; en otros casos, una red calada alrededor de un cardumen de atunes no asociados, o un cardumen asociado con delfines, captura tortugas marinas que están presentes. La tortuga golfinas es, por mucho, la especie de tortuga marina capturada con mayor frecuencia por buques cerqueros; la siguen la tortuga negra (*Chelonia agassizi*), y, muy ocasionalmente, las tortugas caguama (*Caretta caretta*) y carey (*Eretmochelys imbricata*). Se ha registrado mortalidad de solamente una tortuga laúd en los 10 años en que los observadores de la CIAT registran esta información. Algunas tortugas no son identificadas por estar demasiado lejos del buque o porque no había suficiente luz para permitir al observador

² "Otros delfines" incluye las siguientes especies y poblaciones, con las mortalidades observadas correspondientes: delfín listado, 15 (1 t); delfín tornillo centroamericano (*Stenella longirostris centroamericana*), 11 (0,5 t); delfín tonina, 7 (0.7 t); Fraser's dolphin (*Lagenodelphis hosei*) 1 (0.1 t); delfines no identificados, 30 (1,7 t).

identificarla. A veces las tortugas marinas se enredan en malla debajo de dispositivos agregadotes de peces (plantados) y se ahogan. En unos pocos casos, son sacadas del agua por el aparejo de pesca mientras están enmalladas, y pueden caer de la red de alturas considerables y ser heridas, o ser pasadas por la pas- teca hidráulica. La mortalidad estimada³, en número de tortugas, causada por buques cerqueros grandes durante 2005 fue:

	Tipo de lance		
	OBJ	NOA	DEL
Golfina	4.8	6.3	3.8
Negra	1.4	0.0	0.0
Caguama	0.0	0.0	0.0
Carey	0.0	0.0	0.0
Laúd	0.0	0.0	0.0
No identificada	2.0	7.4	1.8
Total	8.2	13.7	5.6

La pesca atunera de cerco es probablemente una causa de mortalidad de tortugas marinas menos importante que otros tipos de actividad humana, entre ellas el aprovechamiento de huevos y adultos, utilización de playas, contaminación, enmalle en detritos en el mar, ingestión de los mismos, y los impactos de otras pesquerías.

Las poblaciones de tortugas golfina, negra, y caguama están designadas como en peligro, y las de carey y laúd como en peligro crítico, por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).

2.4. Tiburones y otros peces grandes

Los tiburones y otros peces grandes son capturados por buques cerqueros y palangreros. El tiburón jaquetón (*Carcharhinus falciformis*) es la especie de tiburón capturada con mayor frecuencia en la pesquería de cerco. Las pesquerías palangreras capturan también cantidades importantes de esta especie, y es necesario un análisis de la pesca palangrera y cerquera en el Pacífico entero para estimar el impacto de la pesca sobre la población. Estimaciones preliminares de los índices de abundancia relativa de tiburones jaquetón grandes, basadas en los datos de la pesca de cerco, señalan una tendencia decreciente durante 1994-2004 en cada uno de los tres tipos de lance cerquero. Se ignora si dicha tendencia se debe a la captura incidental en las pesquerías, a cambios en el medio ambiente (quizá asociados con el Niño de 1997-1998), o a otros procesos. La tendencia no parece ser debida a cambios en la densidad de objetos flotantes.

Una evaluación de la población del tiburón azul (*Prionace glauca*) en el Pacífico Norte ha sido realizada por científicos del NMFS de EE.UU. y el NRIFSF de Japón. Los resultados preliminares brindan un rango de valores verosímiles del rendimiento máximo sostenible (RMS) de 1,8 a casi 4 veces la captura anual de la especie en 2001.

Los descartes⁴ (en toneladas) de tiburones y otros peces grandes en el OPO durante 2005 (aparte de aquellos comentados en lo anterior) por buques cerqueros grandes son los siguientes. No se dispone de datos completos de buques cerqueros pequeños, palangreros y otros.

³ Datos preliminares

⁴ Datos preliminares

	Tipo de lance		
	OBJ	NOA	DEL
Dorado (<i>Coryphaena</i> spp.)	2,357	200	2
Peto (<i>Acanthocybium solandri</i>)	2,025	6	1
Salmón (<i>Elagatis bipinnulata</i>) y jurel (<i>Seriola lalandi</i>)	190	7	<1
Tiburones	522	75	85
Rayas (Mobulidae y Dasyatidae)	10	108	84
Peces picudos	479	44	81
Otros peces grandes	8	<1	<1

Aparte de los peces picudos resumidos en las Secciones G-I del presente informe, y el tiburón azul, no existen evaluaciones de las poblaciones de estas especies en el OPO, y por lo tanto se ignoran los impactos de las capturas incidentales sobre las mismas.

Las tasas de captura de especies aparte de los atunes en la pesquería cerquera son diferentes para cada tipo de lance. Con unas pocas excepciones, las tasas de captura incidental son máximas en lances sobre objetos flotantes, seguidos por lances no asociados y, en un nivel mucho más bajo, lances sobre delfines. Las tasas de captura incidental de delfines son máximas en lances sobre delfines, seguidos por lances no asociados y, en un nivel mucho más bajo, lances sobre objetos flotantes. Las tasas de captura incidental de pez vela, rayas (Mobulidae), y mantarrayas (Dasyatidae) son máximas en lances no asociados, seguidos por lances sobre delfines y luego lances sobre objetos flotantes. Debido a estas diferencias, es necesario seguir los cambios en la frecuencia de los distintos tipos de lance para poder interpretar los cambios en las cifras de captura incidental. En la Tabla A-8 se detalla el número estimado de lances cerqueros de cada tipo realizados durante 1987-2005 en el OPO.

3. OTROS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA

3.1. Aves marinas

Hay aproximadamente 100 especies de aves marinas en el OPO tropical. Algunas aves marinas se asocian con depredadores epipelágicos cerca de la superficie del agua, tales como peces (especialmente atunes) y mamíferos marinos. Estos depredadores arlean a las presas a la superficie para atraparles en la interfaz entre el agua y el aire, donde las aves las pueden alcanzar. La mayoría de las especies de aves marinas capturan sus presas a menos de medio metro de la superficie del mar o en el aire (peces voladores (Exocoetidae) y calamares voladores (Ommastrephidae)). Los depredadores subsuperficiales no sólo arlean a las presas a la superficie, sino que, al herirlas o desorientarlas y al dejar restos después de alimentarse de presas grandes, causan que las aves puedan conseguirlas más fácilmente. Las oportunidades de alimentación de algunas especies de aves marinas dependen de la presencia de cardúmenes de atunes alimentándose cerca de la superficie.

Las aves marinas son afectadas por la variabilidad del ambiente oceánico. Durante el Niño de 1982-1983, las poblaciones de aves marinas en todo el Océano Pacífico tropical y noreste padecieron fracasos de reproducción y mortalidades masivas, o migraron a otros lugares en busca de alimento. Algunas especies, empero, aparentemente no son afectadas por eventos de El Niño. En general, las aves marinas que se alimentan en las zonas de afloramiento del OPO tropical y la Corriente de Perú padecen fracasos de reproducción y mortalidades debido a falta de alimento durante eventos de El Niño, mientras que aquéllas que se alimentan en zonas menos afectadas por El Niño podrían resultar relativamente ilesas.

Según el *Informe del Programa de Investigación Científica bajo la Ley sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines de EE.UU.*⁵, preparado por el NMFS de EE.UU. en septiembre de 2002, no hubo tendencias temporales significativas en las estimaciones de abundancia del período de 1986-2000 de ninguna especie de ave marina en el OPO tropical, excepto una tendencia decreciente en

⁵ Report of the Scientific Research Program under the U.S. International Dolphin Conservation Program Act

caso del petrel de Tahití (*Pseudobulweria rostrata*). Se están revisando la condición y las tendencias de las poblaciones de albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*), patinegro (*P. nigripes*), y de Laysan (*P. immutabilis*).

Algunas aves marinas, especialmente los albatros y petreles, son susceptibles a la captura en los anzuelos cebados en las pesquerías palangreras pelágicas. Datos de rastreo por satélite y de observaciones en el mar han identificado la importancia del Área de la CIAT para los albatros de las Galápagos, de Laysan, y ojeroso (*Thalassarche melanophrys*), más varias especies que se crían en Nueva Zelanda pero que se alimentan frente a Sudamérica. Los datos de la pesquería palangrera pelágica de EE.UU. en el Pacífico nordeste indican que ocurren capturas incidentales de albatros patinegro y de Laysan. Se dispone de pocos datos comparables de las pesquerías palangreras en el Pacífico central y sudeste. En un estudio financiado de fuentes externas, el personal de la CIAT está investigando la condición de la población del albatros patinegro y en Pacífico norte entero, tomando en cuenta los efectos de la captura incidental en la pesca.

Ciertas aves marinas son susceptibles a la captura en anzuelos cebados en las pesquerías palangreras pelágicas. Se analizaron datos sobre las capturas incidentales del albatros de patas negras (*Phoebastria nigripes*) por la pesquería palangrera pelágica de EE.UU. en el Pacífico Norte, pero no se dispone de datos comparables para las pesquerías palangreras en el OPO. En un estudio financiado de fuentes externas, el personal de la CIAT está investigando la condición de la población de esta especie en el Pacífico Norte entero, tomando en cuenta los efectos de la captura incidental en la pesca.

3.2. Forraje

Los grupos taxonómicos de forraje que ocupan los niveles tróficos medios en el OPO son obviamente componentes importantes del ecosistema, formando un vínculo entre la producción primaria en la base de la red trófica y los depredadores de nivel trófico superior, como los atunes y peces picudos. Los efectos indirectos sobre estos depredadores causados por la variabilidad ambiental son transmitidos a los niveles tróficos superiores por medio de los grupos taxonómicos de forraje. Sin embargo, se sabe poco acerca de las fluctuaciones en abundancia de la gran variedad de especies de presas en el OPO. Científicos del NMFS registraron datos sobre la distribución y abundancia de grupos de presas comunes, entre ellos peces linterna (*Myctophidae*), peces voladores, y ciertos calamares, en el OPO tropical durante 1986-1990 y 1998-2000. Las estimaciones de abundancia media de todos los grupos taxonómicos de peces, y en menor grado los calamares, aumentaron durante 1986-1990; fueron bajas de nuevo en 1998, y luego aumentaron hasta 2000. Su interpretación de este patrón fue que los eventos de El Niño en 1986-1987 y 1997-1998 ejercieron efectos negativos sobre estas poblaciones de presas. Durante los cruceros STAR 2003 de NMFS se reunieron más datos sobre estos grupos taxonómicos, y están siendo analizados.

Algunos peces pequeños, muchos de los cuales son alimento para los depredadores más grandes, son capturados por buques cerqueros en el OPO. Las melvas (*Auxis* spp.), por ejemplo, son presas comunes de muchos de los animales que ocupan los niveles tróficos superiores en el OPO tropical. En el modelo del ecosistema del OPO tropical (Sección 7), las melvas forman el 10% a más de la dieta de ocho categorías de depredadores. Pequeñas cantidades de melvas son capturadas por buques cerqueros en alta mar, y por pesquerías artesanales locales en algunas regiones costeras de América Central y del Sur. La gran mayoría de las melvas capturadas por buques atuneros de cerco es descartada en el mar. Los descartes estimados⁶ de peces pequeños, en toneladas, por buques cerqueros grandes con observadores a bordo en el OPO durante 2005 fueron:

⁶ Datos preliminares

	Tipo de lance		
	OBJ	NOA	DEL
Peces ballesta (Balistidae) y cachúas (Monacanthidae)	150	1	<1
Otros peces pequeños	38	2	<1
Melvas (<i>Auxis</i> spp.)	1,699	276	6

a. Peces larvales y plancton

Desde hace muchos años, el personal del Southwest Fisheries Science Center del NMFS captura peces larvales en el OPO con redes de arrastre de superficie. De las 314 categorías taxonómicas identificadas, se descubrió que 17 tenían la mayor probabilidad de mostrar los efectos de cambios ambientales. La frecuencia, abundancia, y distribución de estos grupos clave no mostró ninguna tendencia temporal consistente.

Las poblaciones de fitoplancton y zooplancton en el OPO tropical son variables. Por ejemplo, las concentraciones de clorofila en la superficie del mar (un indicador de afloramientos de fitoplancton) y la abundancia de copépodos fueron reducidas marcadamente durante el Niño de 1982-1983, especialmente al oeste de 120°O. Similarmente, las concentraciones de clorofila en la superficie disminuyeron durante el Niño de 1986-1987 y aumentaron durante la Niña de 1988 debido a cambios en la disponibilidad de nutrientes.

La composición por especies y tamaños del zooplancton es a menudo más variable que la biomasa de zooplancton. Cuando aumenta la temperatura del agua, especies de agua cálida a menudo reemplazan especies de agua fría en lugares particulares. La abundancia relativa de copépodos pequeños frente al norte de Chile, por ejemplo, aumentó durante el Niño de 1997-1998, mientras que la biomasa de zooplancton no cambió.

4. INTERACCIONES TRÓFICAS

Los atunes y peces picudos son depredadores generalistas de gran alcance con requisitos energéticos elevados, y como tal, son componentes clave de los ecosistemas pelágicos. No se entienden bien las relaciones ecológicas entre estos grandes depredadores pelágicos, y entre ellos y los animales de niveles tróficos más bajos. A la luz de la necesidad de evaluar las implicaciones de las actividades de pesca sobre los ecosistemas subyacentes, es esencial adquirir representaciones exactas de los vínculos tróficos y los flujos de la biomasa por la red de alimentación en los ecosistemas del océano abierto, así como conocimientos básicos de la variabilidad natural impuesta por el medio ambiente.

Históricamente, los conocimientos de la ecología trófica de los peces depredadores se basaron en análisis del contenido de los estómagos. Los estudios de las dietas han descubierto muchos de los vínculos tróficos clave en el OPO pelágico, y han formado la base para la representación de las interacciones de la red de alimentación en un modelo de ecosistema (Boletín de la CIAT, Vol. 22, No. 3) para explorar los efectos indirectos de la pesca sobre el ecosistema. La presa más común de los atunes aleta amarilla capturados por buques cerqueros en alta mar son melvas (*Auxis* spp.), calamares y argonautas (cefalópodos), y peces voladores y otros peces epipelágicos. El atún patudo se alimenta a mayor profundidad que el aleta amarilla y barrilete, y consume principalmente cefalópodos y peces mesopelágicos. La presa más importante del barrilete fueron, en general, los crustáceos eufásidos en un estudio realizado a fines de los años 1950, mientras que a principios de los 1990 un pez mesopelágico pequeño (*Vinciguerria lucetia*) pareció predominar en la dieta. Los atunes que se alimentan cerca de la costa utilizan presas diferentes a aquéllos capturados mar afuera. Por ejemplo, atunes aleta amarilla y barrilete capturados frente a Baja California se alimentan fuertemente de cangrejos rojos (*Pleuroncodes planipes*). Más recientemente, los estudios de dieta se han enfocado en entender redes de alimentación enteras, inicialmente con descripciones de las conexiones interespecíficas entre las comunidades de depredadores, formadas por los atunes, tiburones, peces picudos, dorado, peto, salmón, y otros. En general, es evidente una repartición considerable de recursos entre los componentes de estas comunidades, y los investigadores buscan comprender la escala espacial de los patrones tróficos que se pueden observar, así como la influencia de la variabilidad climáti-

ca sobre estos patrones.

Mientras que los estudios de la dieta han contribuido mucho a los conocimientos de la materia, las proporciones de los isótopos estables de carbono y nitrógeno son el complemento ideal al contenido de los estómagos para el estudio de las redes de alimentación. El contenido de los estómagos representa solamente una imagen relativa del alimento más reciente en el momento en el que fue capturado el animal, y bajo las condiciones necesarias para su captura. Los isótopos estables de carbono y nitrógeno, en cambio, integran información sobre todos los componentes de la dieta en el tejido del animal, brindando así un historial reciente de las interacciones tróficas e información sobre la estructura y dinámica de las comunidades ecológicas. Estudios recientes de isótopos estables indican una posición trófica media de 4,2-4,5 para el atún aleta amarilla en el OPO, mientras que los análisis previos de la dieta sugieren que es en promedio 4,6-4,7.

5. AMBIENTE FÍSICO⁷

Las condiciones ambientales afectan a los ecosistemas marinos, la dinámica y capturabilidad de los atunes y peces picudos, y las actividades de los pescadores. Los atunes y peces picudos son pelágicos durante todas las etapas de la vida, y los factores físicos que afectan al Océano Pacífico tropical y subtropical pueden ejercer efectos importantes sobre su distribución y abundancia. Se cree que las condiciones ambientales causan una variabilidad considerable en el reclutamiento de los atunes y peces picudos. Las evaluaciones de las poblaciones realizadas por la CIAT a menudo han incluido el supuesto que las condiciones oceanográficas podrían afectar el reclutamiento en el OPO.

Distintos tipos de perturbaciones climáticas podrían afectar la pesca de distintas formas. Se cree que una termoclina poco profunda en el OPO contribuye al éxito de la pesca atunera de cerco, actuando tal vez de barrera térmica para los cardúmenes de atunes pequeños, manteniéndolos cerca de la superficie del agua. Cuando la termoclina se hunde, como durante un evento de El Niño, los atunes parecen ser menos vulnerables a la captura, y las tasas de captura disminuyen. Temperaturas superficiales del mar (TSM) cálidas o frías pueden asimismo causar que estos peces móviles se desplacen a un hábitat más favorable.

El ambiente oceánico varía en una variedad de escalas temporales, de estacional a interanual, decadal, y mayores (por ejemplo, fases o regímenes climáticos). La causa dominante de variabilidad en las capas superiores del OPO es denominada a menudo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El ENOS es una fluctuación irregular que afecta al Océano Pacífico tropical entero y la atmósfera global. Resulta en variaciones de los vientos, la precipitación, profundidad de la termoclina, circulación, productividad biológica, y la alimentación y reproducción de peces, aves y mamíferos marinos. Los eventos de El Niño ocurren a intervalos de entre 2 y 7 años, y son caracterizados por vientos alisios más débiles, una termoclina más profunda, y TSM anormalmente elevadas en el OPO ecuatorial. La fase contraria de El Niño, denominado comúnmente La Niña, es caracterizada por vientos alisios más fuertes, una termoclina menos profunda, y TSM más bajas. La investigación ha documentado una conexión entre el ENOS y la tasa de producción primaria, la biomasa de fitoplancton, y la composición por especies del fitoplancton. Durante los episodios de El Niño disminuye el afloramiento de agua subsuperficial, rica en nutrientes, lo cual lleva a una reducción notoria en la producción primaria y secundaria. El ENOS también afecta directamente a los animales en los niveles tróficos medianos y altos. Los investigadores han concluido que el Niño de 1982-1983, por ejemplo, incrementó la profundidad de la termoclina y nutriclina, redujo la producción primaria, redujo la abundancia de zooplancton, y al final redujo las tasas de crecimiento, el éxito reproductivo, y la supervivencia de varias aves, mamíferos, y peces en el OPO. Sin embargo, en general los habitantes del océano se recuperan en períodos cortos, porque su ciclo vital está adaptado para responder a un hábitat variable.

La CIAT informa trimestralmente de los datos meteorológicos y oceanográficos mensuales medios del OPO, incluyendo un resumen de las condiciones actuales del ENOS. Estuvo presente un evento débil de

⁷ Gran parte de la información en esta sección proviene de Fiedler, P.C. 2002. *Environmental change in the eastern tropical Pacific Ocean: review of ENOS and decadal variability*. Mar. Ecol. Prog. Ser. 244: 265-283.

El Niño durante el cuarto trimestre de 2004. En el primer trimestre de 2005 estas condiciones cálidas débiles cambiaron a condiciones neutras, y siguieron neutras durante los trimestres segundo y tercero. En el cuarto trimestre de 2005 se desarrollaron condiciones débiles de La Niña (o anti-El Niño).

La variabilidad a escala decadal (o sea, de 10 a 30 años) también afecta al OPO. A fines de la década de 1970 ocurrió en el Pacífico Norte un cambio importante en las condiciones físicas y biológicas. Este cambio de clima fue detectado en el OPO tropical también, mediante pequeños aumentos de las TSM, un debilitamiento de los vientos alisios, y un cambio moderado en los niveles de clorofila en la superficie. Algunos investigadores han reportado otro cambio importante en el Pacífico Norte en 1989. La variabilidad en el océano causada por el clima ha sido descrita a menudo en términos de “régimenes” caracterizados por promedios y patrones relativamente estables en las variables físicas y biológicas. Análisis realizados por el personal de la CIAT indican que el atún aleta amarilla en el OPO ha pasado por un régimen de reclutamiento bajo (1975-1984) y un régimen de reclutamiento alto (1985-presente). Se cree que el mayor reclutamiento durante este segundo período se debe a un cambio a una régimen de productividad más alta en el Océano Pacífico. Las fluctuaciones decadales en el afloramiento y transporte de agua son simultáneas con el patrón de ENOS más frecuentes y tienen efectos en toda la cuenca sobre las TSM y la pendiente de la termoclina que son similares a los que causa el ENOS, pero a escala temporal mayor.

La variabilidad ambiental en el OPO tropical es manifestada de forma diferente en las diferentes regiones donde se capturan los atunes. Por ejemplo, las anomalías de la TSM en la zona cálida del OPO (5° a 20°N, al este de 120°O) han ocurrido con la mitad de la magnitud y varios meses después de aquéllas en el área NIÑO3 en el Pacífico ecuatorial (5°S a 5°N, 90° a 150°O).

6. INDICADORES AGREGADOS

El reconocimiento de las consecuencias de la pesca para los ecosistemas marinos ha fomentado una investigación considerable en los últimos años. Han sido propuestos numerosos objetivos para evaluar los impactos de la pesca sobre los ecosistemas y para definir la sobrepesca desde una perspectiva ecosistémica. Mientras que se han usado los puntos de referencia principalmente para la ordenación de especies objetivo individuales, se cree que un primer paso factible sería aplicar medidas de desempeño y puntos de referencia a especies no objetivo. Ejemplos actuales incluyen límites de mortalidad incidental de delfines en la pesquería cerquera del OPO bajo el APICD. Otra área de interés es la posibilidad de elaborar indicadores útiles de desempeño basados en propiedades a nivel de ecosistema. Han sido propuestos varios indicadores de ecosistema, entre ellos la estructura del tamaño de la comunidad, índices de diversidad, riqueza y uniformidad de especies, índices de solape, espectros tróficos de la captura, abundancia relativa de una especie o un grupo indicador, y numerosos indicadores ambientales. Se opina generalmente que se debería usar indicadores múltiples a nivel de sistema, pero existen dudas sobre la suficiencia de los conocimientos prácticos de la dinámica de estos indicadores, y sobre la existencia de un fundamento teórico para identificar puntos de referencia precautorios o límite basados en las propiedades de los ecosistemas. El uso de indicadores basados en ecosistemas para la ordenación de pesquerías todavía no es común.

Los enfoques ecosistémicos a la ordenación de la pesca ponen énfasis de nuevo en lograr representaciones fieles de los vínculos tróficos y los flujos de biomasa por la red alimenticia en los sistemas explotados. En la ecología de las redes tróficas se usan los niveles tróficos (TL) para caracterizar el papel funcional de los organismos y para facilitar las estimaciones del flujo de energía o masa por las comunidades. En la Figura J-1 se presenta un diagrama simplificado, con NT aproximados, de la red trófica del OPO tropical pelágico. Las ballenas dentadas (Odontoceti, NT medio 5.2), depredadores de calamar grande (atún patudo grande y pez espada, NT medio 5.2) y tiburones (NT medio 5.0) son depredadores ápice. Los otros atunes y peces piscívoros grandes, delfines, y aves marinas ocupan NT ligeramente más bajos. Peces epipelágicos menores (melvas y peces voladores, por ejemplo), cefalópodos, y peces mesopelágicos son el alimento principal de muchos de los depredadores de alto nivel en el ecosistema. Los peces pequeños y crustáceos se alimentan de dos grupos de zooplancton, y el microzooplancton herbívoro (NT 2) se alimenta de los productores, fitoplancton y bacterias (NT 1).

En los ecosistemas pelágicos explotados, las pesquerías dirigidas hacia peces piscívoros grandes actúan

como los depredadores ápice del ecosistema. Con el tiempo, la pesca puede causar una disminución de la composición por tamaño general de la captura, y en general, los NT de los organismos pequeños son más bajos que los de los más grandes. El NT medio de los organismos capturados por una pesquería es un indicador potencialmente útil de cambios en el ecosistema y de su sustentabilidad, porque integra una variedad de información biológica sobre los componentes del mismo. Se está prestando mayor atención al análisis del NT medio de las capturas y descartes de la pesca desde que un estudio demostró que, según estadísticas de descargas de FAO, el NT medio de los peces e invertebrados descargados a nivel mundial disminuyó entre 1950 y 1994. Sin embargo, algunos ecosistemas han cambiado en la otra dirección, de comunidades de NT bajo a comunidades de NT más alto. En vista de la utilidad potencial de este enfoque, se estimaron los NT de una serie de tiempo de capturas y descartes anuales de 1993 a 2004 para tres modalidades de pesca cerquera y la pesquería cañera en el OPO. Se calcularon las estimaciones mediante la aplicación de los NT del modelo de ecosistema del OPO (Sección 7), ponderados por los datos de captura por pesquería y año correspondientes a todos los grupos del modelo de las bases de datos de la CIAT de atún, captura incidental, y descartes. Los NT de las capturas sumadas de todas las pesquerías de cerco y de caña fueron bastante constantes de año a año (Figura J-2: promedio PS-LP). El NT de los lances sobre objetos flotantes varió más que los de las otras pesquerías, debido a la variabilidad interanual en el tamaño de los atunes capturados y la composición por especies de las capturas incidentales en esos lances. No fueron observadas relaciones entre las estimaciones de NT y frecuencia de los distintos tipos de lance.

Se estimaron también por separado NT para la serie de tiempo de capturas retenidas y descartadas por año para la pesquería de cerco de 1993 a 2003 (Figura J-3). Los NT de las capturas retenidas fueron bastante estables de año a año, mientras que los NT de las capturas descartadas variaron considerablemente. La mayor variación ocurrió en el caso de los lances sobre no asociados. El NT bajo de las capturas descartadas en lances sobre peces no asociados en 1998 se debió a una mayor captura incidental de rayas, que se alimentan de plancton y otros animales pequeños que ocupan NT bajos. Entre 1998 y 2001, las capturas descartadas de rayas disminuyeron paulatinamente y las de tiburones aumentaron, llevando a un aumento progresivo del NT de las capturas descartadas durante ese período. En menor grado, el NT medio de las capturas descartadas en lances sobre objetos flotantes aumentó también entre 1998 y 2001, debido principalmente a mayores capturas de petos grandes y dorado pequeño.

7. MODELADO DE ECOSISTEMAS

Es evidente que los distintos componentes de un ecosistema interactúan. La ordenación ecosistémica de la pesca es facilitada por la elaboración de modelos ecosistémicos multiespecíficos que representan las interacciones ecológicas entre las especies o gremios. Nuestros conocimientos del complicado laberinto de conexiones en los ecosistemas del océano abierto están en su etapa temprana, y, por lo tanto, la mayor utilidad de los modelos de ecosistema actuales es como instrumentos descriptivos para explorar los efectos de una mezcla de hipótesis y conexiones establecidas entre los componentes del ecosistema. Los modelos de ecosistema necesitan mantener un equilibrio entre representaciones simplistas por un lado y una complejidad imposible de manejar por el otro.

El personal de la CIAT ha desarrollado un modelo del ecosistema pelágico en el OPO tropical (Boletín de la CIAT, Vol. 22, No. 3) para explorar cómo la pesca y la variación climática podrían afectar los animales en los niveles tróficos medianos y altos. El modelo tiene 38 componentes, entre ellos las principales especies explotadas (atunes, por ejemplo), grupos funcionales (tiburones y peces voladores, por ejemplo), y especies sensibles (tortugas marinas, por ejemplo). Algunos grupos taxonómicos están subdivididos en categorías (marlines grandes y pequeños, por ejemplo). La resolución taxonómica del modelo es más fina en los niveles tróficos superiores, pero la mayor parte de la biomasa del sistema está en los niveles tróficos medianos y bajos. Se estimaron las descargas y descartes para cinco “artes” de pesca: caña, palangre, y tres tipos de lances cerqueros: sobre atunes asociados con delfines, con objetos flotantes, y no asociados. El modelo está enfocado en las regiones pelágicas; no describe adecuadamente los ecosistemas locales costeros.

La mayor parte de la información que describe las interacciones interespecíficas en el modelo proviene de

un proyecto conjunto CIAT-NMFS, el que incluyó estudios de los hábitos alimenticios de atunes aleta amarilla, barrilete, y patudo, delfines, tiburones pelágicos, peces picudos, dorados, petos, salmones, y otros. El objetivo del proyecto fue contribuir a los conocimientos de la asociación atún-delfín, y se adoptó un diseño de muestreo a nivel de comunidad.

Se usó el modelo de ecosistema para evaluar los posibles efectos de variabilidad en los procesos forzados desde abajo por el medio ambiente sobre los niveles tróficos medianos y altos del ecosistema pelágico. Se incorporaron en el modelo series de tiempo predeterminadas de biomasa de productores para aproximar los cambios en la producción primaria documentados durante eventos de El Niño y La Niña, y se simuló la dinámica de los demás componentes del ecosistema. Se usó el modelo también para evaluar las contribuciones relativas de la pesca y el medio ambiente en la formación de la estructura del ecosistema en el OPO pelágico tropical. Se hizo esto usando el modelo para predecir cuáles componentes del ecosistema podrían ser susceptibles a efectos de la pesca de arriba hacia abajo, dada la importancia aparente de la variabilidad ambiental en la estructuración del ecosistema. En general, los animales con tasas de cambio relativamente bajas fueron afectados más por la pesca que por el medio ambiente, y aquellos con tasas relativamente altas más por el medio ambiente que por la pesca.

8. ACCIONES DE LA CIAT Y EL APICD RELATIVAS A CONSIDERACIONES DE ECOSISTEMA

Tanto la CIAT como el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD) tienen objetivos que versan sobre la incorporación de consideraciones de ecosistema en la ordenación de las pesquerías atuneras en el OPO. Acciones tomadas en el pasado incluyen:

8.1. Delfines

- a. Desde hace muchos años se evalúa el impacto de la pesquería sobre las poblaciones de delfines, y los programas para reducir o eliminar ese impacto han tenido un éxito considerable.
- b. Se ha limitado la mortalidad incidental de cada población de delfines a niveles insignificantes con respecto al tamaño de las poblaciones.

8.2. Tortugas marinas

- a. Se ha compilado una base de datos sobre todos los avistamientos, capturas, y mortalidades de tortugas marinas reportadas por observadores.
- b. En junio de 2003, la CIAT adoptó una *Recomendación sobre tortugas marinas*, en la que se contempla “el desarrollo de un programa de tres años que podría incluir la reducción de capturas incidentales de tortugas marinas, investigaciones biológicas de tortugas marinas, perfeccionamiento de artes de pesca, educación de la industria y otras técnicas para mejorar la conservación de tortugas marinas.” En enero de 2004, el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental propuso un programa detallado que incluye todos estos elementos e insta a todas las naciones con buques que pescan atunes en el OPO a que provean a la CIAT información sobre interacciones de las pesquerías con tortugas marinas en el OPO, incluyendo capturas tanto incidentales como directas, y otros impactos sobre las poblaciones de tortugas marinas. En junio de 2004, la CIAT adoptó la [Resolución C-04-07](#) sobre un programa de tres años para mitigar el impacto de la pesca atunera sobre las tortugas marinas; incluye disposiciones sobre la toma de datos, medidas de mitigación, educación de la industria, fomento de capacidad, e informes.
- c. La [Resolución C-04-05](#) de la CIAT contiene disposiciones relativas a la liberación y tratamiento de tortugas marinas capturadas en redes de cerco. Prohíbe también a los buques desechar bolsas y otra basura plástica en el mar, y encarga al Director estudiar y formular recomendaciones acerca del diseño de plantados, particularmente el uso de malla de red sujeta bajo el agua a los mismos.
- d. En respuesta a una solicitud de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ecuador, la CIAT inició un programa, apoyado por World Wildlife Fund y el gobierno de Estados Unidos, para miti-

gar la captura incidental de tortugas marinas, reducir la mortalidad de tortugas marinas causadas por la pesca palangrera, y comparar las tasas de captura de atunes, peces picudos, y dorado con anzuelos J y circulares de dos tamaños. Los anzuelos circulares no enganchan tantas tortugas como los anzuelos J usados actualmente en la pesca palangrera, y la probabilidad de herir gravemente a las tortugas que muerden los anzuelos es menor porque son más anchos y suelen engancharse en la mandíbula inferior, en lugar de internarse en el esófago y otras áreas, evento más peligroso y más común con los anzuelos J. Se difundieron además a las flotas palangreras de la región procedimientos y herramientas para liberar tortugas marinas enganchadas y enmalladas.

Observadores han tomado datos en casi 400 viajes de pesca de los buques que están probando los varios anzuelos. El programa está funcionando en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, y Guatemala, se tiene planeado iniciarlo en Nicaragua en 2006. Se están realizando algunas actividades en México también. El programa en Ecuador se está realizando en conjunto con el gobierno y la Overseas Fishery Cooperation Foundation del Japón, mientras que en los otros países es financiado por agencias de EE.UU. Los resultados iniciales señalan que, en las pesquerías dirigidas hacia los atunes, peces picudos y tiburones (Figura J-4), ocurrió una reducción importante en las tasas de enganche de las tortugas marinas con los anzuelos circulares, y que menos anzuelos se alojaron en el esófago u otras áreas perjudiciales para las tortugas. Las tasas de captura de las especies objetivo son, en general, similares a aquéllas de los anzuelos J. Se realizó también un experimento en la pesquería de dorado (Figura J-4) con anzuelos circulares más pequeños; las tasas de enganche de tortugas disminuyeron, pero menos que en las pesquerías de atunes, peces picudos y tiburones. Además, miembros del personal de la CIAT y otros dirigieron talleres e hicieron presentaciones en todos los países que participan en el programa.

8.3. Otras especies

- a. En junio de 2000, la CIAT adoptó una resolución sobre la liberación de tiburones, rayas, peces picudos, dorados, y otras especies no objetivo.
- b. La [Resolución C-04-05](#) de la CIAT encarga al Director buscar fondos para la reducción de la mortalidad incidental de atunes juveniles, para desarrollar técnicas y/o equipo para facilitar la liberación de peces picudos, tiburones y rayas de la cubierta o de la red, y para realizar experimentos para estimar las tasas de supervivencia de peces picudos, tiburones y rayas liberados.
- c. La [Resolución C-05-01](#) de la CIAT recomienda que las CPC apliquen, en caso apropiado, el *Plan de Acción Internacional para reducir las capturas incidentales de aves marinas en la pesca con palangre* de la FAO; que recopilen y presenten a la Comisión información sobre las interacciones con aves marinas; y que el Grupo de Trabajo sobre las Evaluaciones de las Poblaciones presente a la Comisión una evaluación del impacto de la captura incidental de aves marinas resultante de las actividades de los buques que pescan atunes y especies afines en el OPO. Dicha evaluación debería incluir una identificación de las áreas geográficas en las que pudieran ocurrir interacciones entre la pesca palangrera y aves marinas
- d. Se está elaborando un modelo de población para el albatros patinegro, a fin de evaluar la probabilidad de que los niveles actuales y pasados de captura incidental afecten de forma significativa las poblaciones de la especie, y generar un modelo de especie protegida que pueda ser aplicado a varias especies y usado para proveer asesoramiento sobre la ordenación. Se están usando los datos de los observadores de la CIAT en buques cerqueros para trazar las distribuciones de las aves marinas.

8.4. Todas especies

- a. Se está recabando datos sobre las capturas incidentales por buques cerqueros grandes, y se insta a los gobiernos a proveer información sobre las capturas incidentales de otros buques.
- b. Se han recabado datos sobre la distribución espacial de las capturas incidentales y las proporciones de captura incidental a captura para análisis de opciones de políticas de reducción de capturas

incidentales.

- c. Se ha recabado información para evaluar medidas para reducir las capturas incidentales, tales como vedas, límites de esfuerzo, etc.
- d. Se han realizado evaluaciones de preferencias de hábitat y el efecto de cambios ambientales.

9. ACONTECIMIENTOS FUTUROS

Es poco probable, al menos en el futuro cercano, que se disponga de evaluaciones de las poblaciones de la mayoría de las especies de captura incidental. Es posible que en lugar de evaluaciones formales se puedan desarrollar índices para evaluar tendencias en la condición de estas especies. La experiencia del personal de la CIAT con los delfines sugiere que la tarea no es trivial si se desea una precisión relativamente alta.

Han sido propuestas varias medidas para estudiar cambios en las características del ecosistema, entre ellas estudios del nivel trófico medio, espectros de tamaño, dominancia, diversidad, y otros, para describir el ecosistema de forma agregada.

La distribución de las pesquerías de atunes y peces picudos en el OPO es tal que incluye probablemente varias regiones con características ecológicas diferentes. Es posible que, dentro de éstas, masas de agua, características oceanográficas o topográficas, influencias del continente, etcétera, generen heterogeneidad que afecte la distribución de las distintas especies y su abundancia relativa en las capturas. Sería ventajoso incrementar los conocimientos de estos estratos ecológicos para poder usarlos en nuestros análisis.

Es importante continuar los estudios de los ecosistemas en el OPO. La capacidad de resolver problemas relacionados con la pesca y el ecosistema crecerá con el número de variables de hábitat, grupos taxonómicos y niveles tróficos estudiados y con series de tiempo de datos más largas.




FIGURE J-1. Simplified food-web diagram of the pelagic ecosystem in the tropical eastern Pacific Ocean. The numbers inside the boxes indicate the approximate trophic levels of each group.

FIGURA J-1. Diagrama simplificado de la red trófica del ecosistema pelágico en el Océano Pacífico oriental tropical. Los números en los recuadros indican el nivel trófico aproximado de cada grupo.




FIGURE J-2. Yearly trophic level estimates of the catches (retained and discarded) by the purse-seine and pole-and-line fisheries in the tropical eastern Pacific Ocean, 1993-2004.

FIGURA J-2. Estimaciones anuales del nivel trófico de las capturas (retenidas y descartadas) de las pesquerías cerquera y cañera en el Océano Pacífico oriental tropical, 1993-2004.




FIGURE J-3. Trophic level estimates of the retained catches and discarded catches by purse-seine fishing modes in the tropical eastern Pacific Ocean, 1993-2004.

FIGURA J-3. Estimaciones del nivel trófico de las capturas retenidas y descartadas por modalidad de pesca cerquera en el Océano Pacífico oriental tropical, 1993-2004.




FIGURE J-4. Locations of longline sets by vessels from Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panama and Peru (part), for which observers recorded data on the catches using different types of hooks.

FIGURA J-4. Posiciones de lances palangreros realizados por buques de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú (parte), para los cuales datos de las capturas con distintos tipos de anzuelo fueron registrados por observadores.